

類

證

治

裁

類證治裁卷之六

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝皋校

頭痛論治 大頭痛 發頤 肩稜骨痛 眼眶痛附

頭爲天象。諸陽經會焉。若六氣外侵。精華內痺。鬱於空竅。清陽不運。其痛乃作。經曰。風氣循風府而上。爲腦風。新沐中風。爲首風。犯大寒。內至骨髓。爲腦逆頭痛。以上風。下虛上實。爲腎厥頭痛。頭痛耳鳴。九竅不利。爲腸胃所生頭痛。甚腦盡痛。手足青至節。死不治。陽氣敗絕。條而列之。有因風。因寒。因溼。因痰。因火。因鬱。熱。因伏暑。以上虛痛。因傷食。傷酒。傷怒。與氣虛。血虛。及真頭痛。偏頭痛。內風。癱瘓。腎虛。

水泛腎虛氣逆諸症。因風者惡風。川芎茶調龍。因寒者惡寒。桂枝羌活湯。因

溼者頭重。羌活勝濕湯。因痰者嘔眩肢冷。為太陰痰厥頭痛。半夏天麻湯。

因火者齒痛。連翹丹皮桑葉羚羊角。因鬱熱者心煩。清室音加麥冬丹參或菊

花。因伏暑者口乾。荷葉石膏山梔。因傷食者胸滿。香砂枳。因傷酒

者氣逆。葛花解酲湯。因傷怒者血逆。洗香降氣湯。氣虛者脈大。補中湯加川芎細辛。血

虛者脈芤。或魚尾上攻。眉尖後近髮際為魚尾。真頭痛客邪犯腦手

足青至節。黑錫丹灸百會穴。偏頭痛屢發日久不痊。菊花茶調散。芎、內風

擾顛者筋惕肝陽上冒震動髓海。三才湯加牡蠣阿膠。腎虛水泛

者頭痛如破昏重不安。六味湯去丹皮加沈香。因腎虛氣逆為腎

厥。王真丸。外如雷頭風頭痛起塊或鳴如雷震。清震湯。大頭痛頭面

盡腫由天行時疫甚則潰膿普濟消輕者發頤腫耳前後甘桔湯

荆芥鼠粘子眉稜骨痛山風熱外干痰溼內鬱選奇眼眶痛俱屬

連翹黃芩肝經肝虛見光則痛生熟地肝經停飲痛不可開晝靜夜劇導痰

東垣曰頭痛每以風藥治者高巖之上惟風可到味之薄者陰中

之陽自地升天者也太陽頭痛惡風寒脉浮緊川芎羌活獨為主

少陽頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗寒熱脉浮

緩長實升麻葛根為主太陰頭痛必有痰體重腹痛脉沈緩蒼朮

南星為主少陰頭痛足寒氣逆為寒厥脉沈細麻黃附子主之厥陰

頭項痛或吐涎沫厥冷脉浮緩吳茱萸主之太陰少陰二經雖不上

頭上氣不得暢而為痛也此六經頭痛之治也

頭痛脉候

寸脉緊急或浮弦或短皆頭痛。浮滑為風痰易治。短瀉為虛難治。浮弦為風。浮洪為火。細或緩為濕。

附方

川芎茶調散

見一卷傷風

桂枝羌活湯

桂 羌 防 草

羌活勝濕湯

見一卷溼

半夏天麻白朮湯

夏 麻 朮 參 耆 陳 苓 薑
麥芽 神 麴 蒼 朮 澤 泄

清空膏

芩 連 羌 防 柴 芎 草 茶 調 三 錢

菊花散

見五卷頭風

風 痛 寒 痛 溼 痛 痰 痛 鬱 熱 風 熱

食積傷酒傷怒氣虛血虛溫腎偏痛偏痛偏痛偏痛陽

香砂枳朮丸

木香 砂仁 米煨飯為丸

枳 朮 陳 夏 荷葉包陳

葛花解醒湯

見一卷溼

沈香降氣散

見三卷鬱

補中益氣湯

見一卷中風

四物湯

地 芍 歸 芎

黑錫丹

硫黃 黑鉛 加沈香 紙 肉豆蔻 金鈴子

附子 肉桂 茴香 故

菊花茶調散

即川芎茶調散加

木香 菊花 殭蠶

芎犀丸

川芎 犀角 辰砂 片腦 參 苓 阿膠

辛 梔 麥 草 石膏

透頂散

見五卷頭風

三才湯

天冬 熟地 人參

腎虛 虛 腎 厥 通 利 大 頭 耳 腫 眉 稜 肝 虛 滌 飲 寒 厥 厥 冷

六味丸

見一卷中風

玉貞丸

見五卷厥

來復丹

見三卷嘔吐

普濟消毒飲

見一卷痰

甘桔湯

甘草 桔梗 元參 前胡

荆

防 杏

葛

石膏

鼠粘子

選奇湯

見五卷頭風

生熟地黃丸

生地 熟地 牛膝

羌活

甘菊 杏仁

石斛 龜丸

枳壳

防風

導痰湯

見一卷中風

麻黃附子細辛湯

麻 附

辛

吳茱萸湯

見三卷嘔吐

頭痛

張氏女患頭痛每發須吐盡痰沫痛乃止診其脉沈緩知爲太陰痰厥頭痛倣東垣半夏天麻白朮湯加減愈○按太陰頭痛必有痰也蒼朮半夏湯主之少陰頭痛脉沈細足寒而氣逆麻黃附子細辛湯主之太陰少陰二經雖不上頭然痰與氣逆壅於膈間則氣不暢而頭爲痛也

姪 頭右偏痛右上牙齦迄耳根緊掣右鼻亦窒一醫用大黃滑石失之沈降一醫用柴胡升麻失之升提予謂火鬱生風宜清涼發散用辛以散風苦以降火參氣味主治 內用羚羊角山梔甘菊炒連翹天麻煨桔梗丹皮薄荷鉤藤青荷蒂 外用細

辛白芷羌活川芎當歸蘇葉煎湯熏洗日數次汗泄鼻通緊痛
頓減後於內服原方去連翹加知母爲其便燥數服而平○此症多
由少陽風火鬱遏所致其脉或左弦右沈至陽升巔頂兩寸必
較浮大此其驗也

耳症論治

足少陰腎竅於耳。腎氣充則耳聰。故經言精脫者耳聾也。又言

肝病氣逆則頭痛耳聾。以膽附於肝而膽脉上貫耳中也。精脫失

聰治在腎氣逆閉竅治在膽。凡耳聾以及耳鳴治法悉準乎此。第

就中條析之。有因勞力傷氣者。補中湯加鹽水炒黃有因房勞傷

腎者。滋陰地黃湯益腎散加鹽炒知藥有因陰虛火動者。磁石六味丸加減有因病後虛

鳴者。四物湯加鹽炒知藥有因心腎虧肝陽逆虛風上旋蒙竅者。

川填陰鎮逆佐以酸味入陰鹹以和陽如山黃有臟氣逆為厥聾

地黃磁石龜版天冬麥冬白芍五味牛膝秋石有臟氣逆為厥聾

者。流氣散當歸龍薺丸有風入絡為風聾者必兼頭痛。防風通聖散有因怒氣壅

者。流氣散有因驚火鬱者。清膽湯有氣閉猝聾者。芎芷散有年久耳聾

者。清神散

者。勝金透。有小兒耳聾者。通鳴散。有腎經熱右耳重聽兼苦鳴者。黃地

湯。有肝膽火升常聞蟬鳴者。龍膽瀉肝湯。有因痰火升而鳴者。加減

丸。總之由痰火者其鳴甚由腎虛者其鳴微又有耳中津液結塊。

名耳聾。肝湯。有風溫上鬱耳聾右脹者。馬勃散。有左耳聾痛挾暑

風上鬱者須辛涼輕劑。菊葉苦丁茶。山梔。有因暑邪閉竅者。鮮荷

有耳聾脹少陽火鬱。羚羊湯。耳聾流膿。黃蘗麩或甲片。小兒胎風耳膿。

散吹耳忽大痛如蟲蠕動。蛇蛻燒存性。寒熱耳大痛者疔也。以疔內

外紅腫痛者耳癰也。活命飲。加耳聾耳疔不寒熱不作膿。黃連消

命皆足少陰手少陽。腎與三焦。風熱上壅致之此耳症大概也。

耳症脉候

尺脉浮而盛為風。洪而實為熱。細而澀為虛。兩尺數為陰火上衝。

附方

補中湯 見一卷中風

滋陰地黃湯 六味地黃加 歸 芍 芎 芎 菖蒲 遠志

益腎散 磁石 巴戟 沈香 菖蒲 川椒各研末二錢 用猪腰子一个切開和葱白食鹽紙包煨空心酒下

磁石六味丸 六味地黃加 磁石

四物湯 地 芍 歸 芎

腎氣丸 見二卷虛損

流氣散 參 苓 朮 草 青 陳 芷 枳 檳 櫟

木通 腹皮 草果 蓬朮 葛蒲 蘇葉

氣逆

當歸龍薈丸

見一卷火

風

防風通聖散

見一卷痛風

怒

清神散

羌活

防

刺

芎

菊

草

殭蠶

木通

木香

火

清膽湯

青蒿

菊葉

薄荷

連翹

苦丁茶

荷葉

氣鬱

芎芷散

川芎

錢半

芷

辛

樸

夏

陳

蘇

桂

草

久閉

勝金透關散

鼠膽

川烏

細辛

膽礬

麝香

小兒

通鳴散

菖蒲

遠志

防風

柴胡

麥冬

細辛

杏仁

腎虛

六味湯

見一卷中風

肝火

龍膽瀉肝湯

見三卷諸氣

痰火

加減龍薈丸

芩

梔

歸

柴

龍膽

大黃

青皮

青

神麝

丸

見五卷癘風

通草

苦丁茶

桑葉

麝香末吹之

見五卷鶴膝風

卽並日濟消毒飲見一卷疫

龍骨炙六

分明雄七分 麝香少許
研細以綿蘸藥引入耳中

研細以綿蘸藥引入耳中

耳

姪 腎開竅於耳膽脉亦絡於耳夜讀神勞素有遺泄弱冠內真
陰未充虛陽易於升動故氣閉清竅若聞鳴響宜用輕劑清少
陽膽火之鬱鮮桑葉丹皮梔皮連翹甘菊炒食後泡湯服久之
一日耳中忽清亮如涼風捲霧豁然朗徹矣

王 七旬耳猝刺痛伏枕不減右尺沈按有力凡來勢驟者莫如
火老人真陰涸故相火易炎權用鎮攝法靈慈石錢一黃蘗酒炒
山梔錢半熟地錢三劑效

目症論治

經云五藏六府之精氣上注於目而爲之睛。睛之窠爲眼。骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲白眼。肉之精爲約束裏攢。故肝屬木爲黑睛。曰風輪。心屬火爲二眦。曰血輪。脾屬土爲上下胞。曰肉輪。肺屬金爲白仁。曰氣輪。腎屬水爲瞳神。曰水輪。此五輪也。膽之府爲山廓。大腸之府爲天廓。膀胱之府爲澤廓。肝之府爲風廓。腎之府爲水廓。命門之府爲火廓。脾胃之府爲地廓。小腸之府爲雷廓。此八廓也。入廓有或蘊積風熱或鬱結七情之氣各隨五臟所屬而見風則散之熱則清之氣結則調之。瞳胞自癢清淚赤痛是謂風眼。洗肝散。烏輪突起胞硬紅腫是謂熱眼。黃連湯。眼昏而淚

胞腫而軟。酸澀微赤。怒則目疼。是謂氣眼。宜石決明草決明楮實

等。草子和云。目不因火。則不病。氣輪赤。肺火也。肉輪赤。脾火也。水風

輪。腎遮。肝腎火也。赤脈貫目。火自甚也。治目者。專主治火。一句可

了。東垣云。目得血而能視。五臟六腑之精。皆稟受於脾。治目者。宜

理脾胃。養血安神。為主。二說皆有見地。不可執一也。

目痛有二。一曰眇。白眼痛。一曰珠黑。眼痛。眇白。屬陽。晝痛。點苦

寒藥。則效。珠黑。屬陰。夜痛。點苦寒藥。反劇。治目珠。夜痛。夏枯草散。風

熱痛。瀉青丸。洗肝散。天行赤熱。怕熱羞明。涕淚交流。酒煎散。大鬚風客

熱。白仁壅起。包小烏睛。疼痛難開。瀉肺湯。赤腫痛甚。瀉肺湯。目赤

痛而頭目浮腫。普濟消毒飲。怕熱羞明。頭目脹痛。選奇珠疼如鍼刺

心經實火。洗心散。熱結膀胱。小便不通。五苓散。雷頭風。目痛便秘。清

湯。陽邪風症。眉稜骨痛。兼火者。選奇湯。陰邪風症。腦後枕骨疼。還睛丸。

三因。癰頂風症。頂骨內痛。連及目珠。脹急。赤外症之惡候。辛湯。

也。若昏眇。則內症成矣。外症用。羌活勝風湯。內症用。中和養胃湯。

赤目。戴復庵云。眼赤皆血壅肝經所致。屬表者。羌活勝風湯。屬裏者。瀉肝

赤久生翳膜者。春雪膏。凝仁膏。非用碧雲散吹鼻。凡赤而腫痛。當散溼熱。赤而

乾痛。當散火毒。赤而多淚。當散風邪。赤而不痛。當利小便。其或

血灌瞳神。大黃當歸散。赤脉貫睛。凡外障有此。頗為難治。洗心散。赤

絲亂脉。點以石燕丹。服用大黃當歸散。酒煎散。

目腫有胞腫珠腫不同。胞腫多溼。珠腫多火。暴風客邪。胞腫如杯。

洗肝散。五輪壅起。目服不能轉。若鵲之睛。散。酒煎。風毒溼熱。瘀血。

龍膽飲。胞與珠脹出如拳。石膏散加羌。辛芎芎薄荷。若珠爛則無及矣。至於氣。

輪平。水輪亦明。惟風輪泛起。或半邊泛起。服以涼膈散。若水輪。

高而綻起如螺。為肝熱甚。點以石燕丹。春雪膏。內服。神珠自脹。

麻木淚痛。因五臟毒風所蘊。大黃當歸散。

目風熱。四生血虛。四物湯加羌。大凡有病之目。重一番。

而病源非一。微癢則屬虛火。治宜薑黃散。大時將一丸納大。風濕湯蒸洗。

或用珍珠膏點之。

外障。風熱上壅。上下胞努肉。枯雷磨蕩其睛。久之生翳。宜消風散。

熱外。用點藥退之。或如雲霧如絲縷如秤星在睛外遮睛。皆涼。

藥過多脾胃受傷生氣不能上升所致。自內背而出者。羌活勝
葛自銳背而入者。上湯加膽自上而下者。上湯加黃自下而上
荆者。上湯加搗鼻。以碧點藥。皆用春雪膏。麝仁膏。或如去老腎則
木通。以熊膽膏選用。張石頑曰。外障內治之藥雖多。咸以神消散
 以石燕丹。春雪膏。張石頑曰。外障內治之藥雖多。咸以神消散
 為主。外治之藥不一。莫如石燕為最。血腎包睛。破血藥兼硝黃下
 之。或紅腎如輕霞映日之狀。治宜去風散血。若黃膜上衝。服以
 散。照以黃膜下垂。遮滿瞳神。蟬花散。加石膏。膽草。赤膜下垂。神
 石燕丹。散。去二蛻。加皂莢。凝脂。腎在風輪上。急用神消。花腎白陷。龍膽
 石決明。照絳雪膏。凝脂。腎在風輪上。急用神消。花腎白陷。龍膽
 破壞風輪。神膏綻出。凸如蟹睛。防風。斑脂。腎色白而帶青黑。
 內服神消散。有腎從上而下。貫及瞳神。狀如懸膽。服以石膏散。
 外點石燕丹。有腎從上而下。貫及瞳神。狀如懸膽。服以石膏散。

烏珠上白顆如星。蟬花散去蒼朮加茯苓。穀精并用碧雲散吹鼻。烏珠上細顆或白或

黃或聚或散或頓起或漸生多由痰火。服羚羊角散或補腎丸。努肉起於

大眥漸侵風輪掩過瞳神宜和血清火。點以石燕丹。大眥起紅肉如

雞冠一塊害及氣輪。宜三黃丸加芒硝點以絳雪膏。此治外障法也。

^{內障}屬虛挾氣鬱外似好眼而不能照物不痛不癢惟瞳神裏面有

隱隱青白者皆臟腑中邪乘虛入而為翳也青風障內有氣色

如晴山籠淡煙之狀急宜治之免變綠色。羚羊角湯。綠風障瞳神濁

而不清久則變為黃風。上方同。黑風障與綠風相似但時時黑花

起先與去風後用補腎磁石丸。黃風銀風障不治絲風障瞳神內隱

隱有一絲橫經。宜六味丸加細辛茯苓。偃月障如新月覆垂。先與三因芍

腎丸。仰月障瞳神。下半邊有白氣一灣。如新月。仰從下而上。補腎
銀障。瞳神白色如銀。初服羚羊補肝金障。治同。綠映瞳神。瞳神
內隱隱綠色。先服黃連羊肝丸。其自視如蠅飛花墜。旌旆飄揚。
或黃或白。或青或黑。黃白者痰火傷肺。皂莢青黑者宜補腎。
磁石。瞳神散大。六味丸加五味子。石。瞳神緊小。先服黃連羊肝
丸。加二冬。或瞳神欹側。六味丸加暴盲經云氣脫者目不明。急服
用滋腎丸。蛤粉丸。至於膏傷珠陷。神水將枯。並宜大補腎精不
獨參。雀盲。煮肝散。可寒涼。又有目珠上下轉運如轆轤。甚則瞳神反背。補中益氣
此治內障法也。湯加羌活。

雜

能遠視。不能近視。陰氣不足也。治在心腎。加減地芝丸。能近視。

不能遠視。陽氣不足也。治在膽腎。或加味定志丸。倒睫拳毛。由目

緊皮縮所致。久則赤爛。神水不清。以三稜刺目。眦瀉其溼熱。後

防風。搐鼻。以碧雲散。更以木鷲子一枚為末。左塞右。右塞左。一夜即直。脾翻粘。噦血。壅於內。

皮急。弔於外。宜刺剔。風沿爛眼。年久不愈。而多癢者。服柴胡飲子。點麝仁。

若迎風赤爛。川芎茶調散。洗肝散。因風流淚。菊花散。其實熱生瘡。宜瀉心

火。祛風熱。椒瘡生於脾內。紅粒如椒。而堅硬者是也。宜祛風熱。

粟瘡亦生脾內。色黃而軟如粟。宜退溼熱。五疳症。木疳生於風

輪。青碧色。實者。瀉青丸。虛者。補腎丸。火疳生於脾眥及氣輪。初起如

椒瘡。三黃湯。上疳。俗呼偷鍼眼。瀉黃散。金疳生於脾內。與玉粒相

似。失治則變漏。瀉肺湯。水疳生脾眥及氣輪。狀如黑豆。若在風輪。

目必破損頭風人多有此。清空至於瘡久成大眚漏。金花大加羌活蠅尾小眚漏。導赤散加透正漏生風輪上流膿如痰急宜瀉肝偏漏生氣輪上流出白水急宜瀉肺更有精神亂而妄見視定反動視正反邪生暈變色皆陰精虧也。駐景大益氣聰明又或目爲物傷積血青紫撞破白仁黃仁。宜酒煎散漸生腎障犀角地黃湯飛絲入目。宜頭垢點之上論根掘石頑醫通舉其大畧如此。

用藥例

表藥。連翹薄荷黃蘗膽草蔓荊細辛厚樸桑皮前胡甘草以上各味爲君。紅加赤芍散血加紅花桃仁血熱頭痛加鬱金黃連有風加防風羌有毒加升麻有當歸尾。元參熱腫加大朴硝有淚加木賊膽有癢加蟬退凡虛弱年老腫加秦皮熱腫加大黃有淚加草薢有癢加蒺藜。

人宜裏不宜表

裏藥

熟地防風茯苓
薄荷厚樸枳壳

以上各味爲君虛紅加

歸尾烏梅風加防已
川芎丹皮白芷

腫加

荆芥車前

淚加青蘆夏枯
元明粉草香附

心經

黃連山梔知母黃芩柴胡連翹

肝經白芍黃蘗膽草款冬青
薄荷麥冬羚羊款冬菊花牛蒡

辛石解

脾經石膏元參朴硝厚樸黃蘗

肺經相子草決明夏枯草細
茯苓地膚子廣皮前胡

母天冬

百部麻黃

腎經枸杞巴戟牛膝地黃兔絲子當歸磁石白
山梔檳榔葶藶

黃蘗

元參

去腎

青柏子木賊蒺藜蜜蒙花夜明砂石決明

止淚夏枯草蔓荆
穀精草草決明犀角人參朴硝瞿麥蟬蛻

草白附子

去風

防風羌活薄荷獨活升麻甘菊

退腫大黃樸硝白
皮硝青鹽

鬱金元明粉

秦皮

散血

歸尾蘇木赤芍紫草羌蔚子生地青皮

治

桑皮枳壳甘菊

散血

烏梅苦參牛膝延胡蒺藜熟地當歸

盲。夜明砂石決明蜜蒙花。去膜。蒺藜。明目。青箱。枸杞。兔絲子。石
草。地黃。蠟蛻。慈石。石斛。黃連。黃芩。黃蘗。梔子。連翹。赤芍。柴胡。元
望月砂。甘菊。羌蔚子。退熱。參。石膏。甘草。犀角。硃砂。膽草。大黃。朴硝。
羚羊角。元明粉。槐角。退熱。參。石膏。甘草。犀角。硃砂。膽草。大黃。朴硝。
攪金。元。止痛。乳香。沒藥。

附方

洗肝散 薄荷 當歸 羌活 防風 山梔 甘草各一兩
酒製大黃二兩 川芎八錢 每服三錢日三服

黃連湯 黃連 甘草

瀉青丸 膽草 山梔 大黃 川芎 當歸 羌活 防風

夏枯草散 夏枯草 製香附 甘草 茶調服 或痛久血
傷加當歸 白芍 生地 黃耆

酒煎散 漢防己 防風 炙草 荆芥 當歸 赤芍
牛蒡子 甘菊 加酒煎

大黃當歸散 酒製大黃 酒炒黃芩各一錢 紅花二錢
蘇木 當歸 酒炒黑山梔 木賊各五錢

風眼 熱眼 熱痛 珠痛 赤痛 腫痛

瀉肺湯

羌活

元參

黃芩各一錢

地骨

桑皮

大黃

普濟消毒飲

見一卷痰

選奇湯

見五卷頭風

洗心散

麻黃

當歸

大黃

白朮

芍藥

荊芥

甘草

五苓散

見一卷溫

清震湯

見五卷頭風

還睛丸

生白朮

兔絲子

蕤黎

木賊

羌活

青箱子

三因芎辛湯

附子

川烏

南星

乾薑

細辛

川芎各

羌活勝風湯

羌活

生白朮

各一錢

川芎

桔梗

枳殼

分 防風五分

細辛二分

薄荷

黃芩各八分

甘草各四分

水煎食後服

外障 大頭 脹痛 積熱 便閉 雷頭 風疹 陰風 外症

內症赤腫點

冲和養胃湯 補中益氣湯去陳皮 加羌活 防風 黃連

瀉肝散 梔子 荊芥 大黃 甘草

春雪膏 一名絳雪膏 將黃連一兩當歸五錢河水煎汁去滓入童便半盞

將爐甘石丸如彈子多刺以孔煨赤淬藥汁內以汁盡為度

置地上一宿去火氣收貯待用 礪砂研細水調蓋內炭火

緩緩煨乾取淨一錢半 黃丹 乳香 烏賊骨燒研 白

丁香各一錢半 麝香 輕粉各五分 煉白蜜四兩先下

製淨爐甘石末一兩不住手攪次下後七味攪至紫金色不

粘手為度捻作挺子每用少許新水磨化點之

又方 人乳白蜜等分相和淬之再煨再淬汁盡為度入冰片

麝香青鹽礪砂各二分研勻每用少許井花水調點

大小皆

點

麝仁膏 麝仁去皮研極細紙包壓去油再研再壓數次取淨

麝仁霜五錢 濃煎秦皮汁調和隔紙瓦上焙熟有

焦者去之塗淨碗內 以艾一錢分作三團每團置蜀椒一

粒燒烟起時將碗覆烟上三角墊起熏之烟盡晒乾再研人

風熱生醫吹鼻赤脉諸醫外障

胞腫

珠砂 麝香各五分 磁罐收貯 如點老醫加礪砂少許日

點大眚二次 又方 麝仁如上壓去油取霜五錢 入龍膽五分 煉白蜜

一錢五分再研勻收貯點之 此局方春雪膏 又麝仁膏 麝仁如上壓去油五錢 入麝香 硃砂水飛各

五分 碧雲散 驚不食草嗅之即嚏者真 青黛 川芎各半兩研

先喻水滿口每用菰豆許搐鼻內以嚏為度 導赤散 見一卷溫

石燕丹 爐泔石四兩 用黃連一兩歸身木賊羌活麻黃各

五錢河水二升煮便一升同煮去滓 將爐泔石煨 泔製法如春雪膏取淨一兩 礪砂銅勺內同水煮乾 石

燕 琥珀 硃砂水飛各取淨錢半 麝香各分半 右為極細末每川少

白丁香代之 冰片 麝香各分半 右為極細末每川少 許點大眚 如枯瀉無淚加熊膽一分白蜜少許 血醫加

阿魏 黃醫加雞內金 風熱醫加麝仁 熱醫加真珠牛 黃 老醫倍礪砂加猪脂子 冷醫加附子尖雄黃 龍膽飲 黃芩 犀角 木通 車前 黃連 元參各一錢

龍膽飲 梔子 大黃 芒硝各錢半 膽草 淡竹葉各八

頭風瀉火熱極肝熱目癢昏霧老醫一切黃膜

分黃藥炒五分

水煎分二次服

石膏散生石膏三兩
痰藜炒一兩

藥本生白朮
炙草各兩半
白

涼膈散見一卷中風

雙解散涼膈散去竹葉
防風荆芥

桔梗加麻黃石膏
川芎當歸滑石生白朮
芎藭黃

六味丸見一卷中風

四生散批開入藥
白附子黃耆獨活
黃耆獨活痰藜
等分爲散用猪腎

珍珠膏羊脂一箇洗淨刺一孔出汁
草膏以點老人眼效此加珍珠一二錢
白蜜對勻和攪名百

熊膽膏用黃連三錢濃煎去滓
煨過水飛丸如彈子大每淨一兩分作十九
錢琥珀五分瑪瑙水飛三分
珊瑚水飛三分珍珠

煨飛三分硃砂水飛五分
冰片麝香各二分和勻點
珍珠

神消散黃芩蠅蛻炙草
油炒製精各二兩
木賊各一兩蒼朮便浸蘇

外障一切膜

黃膜

蟹睛障翳痛

皂角丸

生白朮 茯苓 蟬蛻 元精石 甲片 煅當歸

皮蛤粉炒

人參一兩 赤芍 通翹各一兩半

木賊草 白菊花 獐猪爪三十

枚蛤粉炒

皂十二挺

煨存性和勻煉白蜜為丸每服一錢半空心杏仁

湯送下

或與生熟地黃丸並進

夾藥煮熟

臨臥原汁送下

蟬花散 蟬蛻五錢 蛇蛻二錢 川芎 防風 羌活 炙

蒼朮麻油拌炒各一兩半 茶調下

防風瀉肝散 防風 羌活 桔梗 羚羊 赤芍 元參

二錢 防風瀉肝散 黃芩各一兩 細辛 甘草各五錢 川芎

羚羊角散 羚羊角一兩 白菊花 川烏頭炮 川芎

辛二錢

為散每服二錢 薑湯調 薄荷湯送下

陷腎加升麻五錢 肉桂二錢

補腎丸

巴戟 山藥 補骨脂 丹皮各二兩 茴香一兩

茯苓 枸杞各四兩 青鹽五錢 蜜丸

痛

障

翳

痛

障

翳

實熱青風黑風腎虛肝風赤脉腎火雀育 雀育

三黃丸 黃連 黃芩 大黃 蜜丸 一名三黃湯

羚羊角湯 羚羊角 人參 各一錢半 元參 地骨皮

補腎慈石丸 慈石 醋煨 甘菊 石決明 煨各一兩 兔絲

五隻去皮嘴留腸以青鹽二兩水三升煮雀至爛為度持如

羚羊補肝散 羚羊角 人參 茯苓 防風 細辛 元參

黃連羊肝丸 黃連一兩 羯羊肝一具去筋膜和搗為丸

滋腎丸 見一卷火

蛤粉丸 蛤粉 黃蠟 等分 鎔蠟投蛤粉捏作餅每餅重三

鍋內泔水煮乘熱熏目至溫喫肝并汁以愈為度

養肝散 夜明砂 蛤粉 穀精草各一兩 為散每服三錢

目動不能近視遠盲背癰腫風痛因風流淚偷錢

補中益氣湯

見一卷中風

加減地芝丸

生熟地黃各四兩 當歸各二兩

天冬 麥冬

枸杞各三兩 黃肉各三兩

甘

味子一兩

蜜丸 酒下

加味定志丸

遠志

石菖蒲各二兩 茯苓三兩

肉桂一兩

人參 蜜丸

炙黃耆各四

防風飲子

錢 荊

黃耆 黃連

炙草 防風

蜜丸

葛根各一

錢 當歸七分

柴胡飲子

柴胡

羌活 防風

赤芍 炙草五分

桔梗

荊芥

生

川芎茶調散

見一卷傷風

菊花散

蒼朮半觔 同皂莢三挺 砂鍋內煮一日去皂角將蒼朮刮去皮切片 鹽水炒淨三兩

木賊

草決明

茶調服 或加蟬

蛻 蟬蛻

瀉黃散

見一卷火

頭風熱毒腎虛陰虧涼血

清空膏

見本卷頭病

金花丸

黃連

黃芩

黃蘗

駐景丸

熟地六兩

當歸

枸杞各四兩

車前

五味各

二兩

楮實五兩

椒紅一兩

兔絲餅二兩蜜丸

益氣聰明湯

保元湯加

升麻


葛根

蔓荊

黃蘗

犀角地黃湯

見一卷溫



目

李氏有年血衰腎之精華不能上注於目常時似有黑物擁蔽銳
眦低頭則如黑灰紛撲左脉短濇此肝腎陰虧瞳神失斂也倣
東垣明目地黃丸用熟地杞子山藥茯神當歸五味柴胡白芍
蜜丸遂愈

一 小兒夜熱渴數面腫目瞶羞明白睛微黃此脾虛不能約制而
爲肝經風熱所乘用薏仁丹皮茵陳山梔鉤藤甘菊甘草茯神
二服汗津津熱退渴縮加潞參白芍又數服諸症悉平

族婦久患目赤產後鬱怒赤腫難開服散火解鬱之劑未效診其
脉脾弱肝強議扶土制木目疾可瘳砂仁陳皮白茯苓白朮天

麻炙草甘菊川芎山梔草決明加棗外用洗藥蠶沙夏枯草冬桑葉菊葉煎湯熏洗數次而病若失

馬氏左目久昏右目復眊服眼科苦寒之劑畏冷減食脉弱如無此有年陽衰神水欲竭惟補養神膏右目可復用黨參杞子鹿角膠沙苑子當歸玉竹桑葉龍眼先服補中湯二劑後再服前藥加故紙核桃數十服右目復初

張氏目大眚脉赤浮膜漸入風輪按大眚屬心爲君火風輪屬肝爲風木子能令母實火動風生宜抑火以退風用木賊穀精消膜赤芍連翹瀉火枳壳當歸通元府甘菊散風龍眼歸目四服全消

王 春初兩目腫痛難開旬日後白睛通赤入上眥中裏白膜視物無覩服散風火退浮醫之藥不應更用挑鍼點藥益劇診之脉虛疾予謂前法俱非也此肝腎受損陰火上乘耳用杞菊地黃湯大劑煎服數日而明復膜漸消

李 精散則視歧精虛則目暗今病後未復再傷腎陰脉虛大頭震眩目赤紋內障視眊心煩不眠治宜補坎鎮離切忌寒涼清降倣東垣先生法熟地苤蓐子枸杞子五味子茯神龍齒棗仁當歸龍眼肉數劑而明復障消

[illegible]

鼻口症論治

肺竅於鼻。脾竅於口。鼻別香臭。不聞香臭者。病在肺。經云。肺和則鼻知香臭。

口別五味。不知味者。病在脾。鼻之呼吸通腦。肺感風寒。則鼻塞。

聲重。參蘇飲。羌活湯。若風熱壅肺。亦致嚏涕聲重。宜疏散。菊花茶。肺火盛。

鼻塞。宜清解。肺飲。黃連清。鼻塞甚者。往往不聞香臭。華澄。茄丸。有腦漏成鼻。

淵者。由風寒入腦。鬱久化熱。經云。膽移熱於腦。令人鼻淵。宜辛涼開上。宣鬱。辛夷。

消風散。加羚羊角。有流涕成鼻。熱者。肺受寒而成。宜溫散。蒼耳散。苦丁茶。葉黑山梔。川椒散。

有精氣不足。腦髓不固。淋下。並不腥穢。天暖稍止。遇冷更甚者。宜

溫補。天真。有瘕肉如棗核。生鼻中。為鼻痔。由胃有食積。熱痰流注。

星真散。有肺熱極。而生瘕肉。如橘子下垂。閉塞鼻竅。氣不得通。由

風熱鬱滯。辛夷消風散。有瘰肉痛甚。由膏梁積熱。溼蒸肺門。如雨。

霽泥地。突產菌芝。瀉白龍勝溼湯外以白礬末。有鼻端紅腫赤皴。

名酒鼓鼻。由飲酒不節。致風熱上攻。血熱不散。疏風散。荆防瀉白。

兩研細人。有不飲酒而鼻色赤。名肺風。由血熱鬱於肺。清肺。有鼻。

生粉刺。枇杷。此三症。忌火酒辛熱諸品。鼻症之概也。靈樞經曰。鼻。

黑為勞。色赤為風。色黃。口之津液通臟腑。肝熱則口酸。湯。加龍。

為便難。色鮮明為留飲。膽草。膽熱則口苦。龍膽瀉。心熱亦口苦。黃連瀉。脾熱則口甜。湯。加黃。

青皮。肝湯。胃熱則口臭。清胃。虛則口淡。養胃進。肺熱則口辣。瀉白。甚則口。

腥。加減瀉。腎熱則口鹹。滋腎。胸胃熱鬱則口臭。加減甘。口糜者。涼。

散。口瘡者。赴筵散。通治俱用。龍腦雞。唇病因火居多。涼藥必兼發。

蘇大。

散。上唇屬腎。下唇屬心。脾熱。唇口燥裂者。瀉黃。
此兩腮牙關屬胃。有心脾熱。唇口燥裂者。飲子。有唇口緊小。不
能開合。名繭唇者。黃蘗散敷之。口症之概也。

鼻口症脉候

正傳曰。左寸浮緩為傷風。鼻塞流涕。右寸浮洪為鼻欬。回春曰。口
舌生瘡。脉洪疾速。若見脉虛。中氣不足。脉訣曰。左寸洪數。心熱。口
苦。右寸浮數。肺熱。口辛。左關弦數。膽虛。口苦。倘若洪實。肝熱。口酸。
右關沈實。脾熱。口甘。洪數則口瘡。

附方

參蘇飲。參。蘇。苓。夏。陳。葛。枳。桔。草。前胡。

羌活湯。羌。防。辛。芎。芷。地。苓。草。蒼朮。葱。

風寒鼻塞

風熱 菊花茶調散 見本卷頭痛

肺火 黃連清肺飲 黃連 山梔 豆豉

塞甚 葦澄加丸 薄荷二錢 荊芥穗一錢 葦澄加二分 蜜丸 含化

宣鬱 辛夷消風散 辛夷 細辛 藁木 芎 芷 防 草 升 麻 木通

鼻齋 蒼耳子散 蒼耳子 辛夷 薄荷 白芷 等分爲末服二錢

溫散 川椒散 川椒 細辛 芎 藁 桂 附 吳萸 皂角 等分醋浸 脂油熬 綿蘸塞鼻中

溫補 天真丸 人參 天冬 精羊肉 菴蓉 山藥 當歸 黃耆 白朮

鼻痔 星夏散 星 夏 辛 芷 芩 連 草 蒼朮 神麴

外治 瓜礬散 瓜蒂 甘遂 枯礬 草烏灰 螺壳灰 麻油調 作丸 日一次塞鼻內近痔處卽化水而愈

肉瘰 瀉白散 見一卷火

廣

皱酒

魔亦

風月

刻切

熟肝

热证

熱心

熱脾

熱胃

養胃進食湯 參 苓 朮 樸 陳 麴 草 麥芽 蒼

加減瀉白散 桑皮二錢 桔梗錢半 地骨皮 炙草各一錢 黃芩 麥冬各五分 五味十五粒 知

母七分 日二服

滋腎丸 見一卷火

加減甘露飲 石 寒水石 石膏 芩 草 澤 木香 滑

涼膈散 見一卷中風

赴筵散 白 連 梔 葉 薑 辛 等分 又方 銅錄

龍腦雞蘇丸 薄荷一兩六錢 生地六錢 麥冬四錢 蒲

人參 黃耆各一錢 阿膠 木通 柴胡各二錢 甘草錢半

瀉黃飲子 草 五 分 防 夏 升 枳 石斛各一錢 甘

喉唇

治通痞口糜口熱熱腎

腥口痰口

唇

以仁湯

見五卷痺

齒舌症論治 牙癰 骨槽風 牙疳 多骨疽附

齒為腎之標。舌乃心之苗。故齒舌多心腎見症。條而析之。上齒則胃絡所經。止而不動。喜寒飲而惡熱飲。下齒則大腸絡所貫。嚼物能動。喜熱飲而惡寒飲。其為病或痛搖宣露。疏豁枯落。不外風火蟲虛。其風熱痛。齒齲腫。犀角升麻湯。荆風冷痛。齲不腫。日漸動搖。溫風散。以開笑散含漱。腸胃積熱痛。齲腫腐臭。加石膏。客寒犯腦。齒連頭俱痛。羌活附子溫邪。上胃痛連齲頂。玉女少陽火鬱結核。齲痛。羚羊湯。細辛散。梔丹皮元參金銀花連翹知母。痰火注絡攻痛。二陳湯加瘀血攻齲痛。如鍼刺。加甘露飲。以醋煎。齒齲有孔。蟲蝕齲痛。一笑散。定齲腮俱痛。連頭面腫者。實火也。升麻石膏湯。齒齲腫痛。頭而不腫者。虛火也。滋陰抑火湯。齒齲

黑爛由腎虛者。安腎丸。胃火上攻齒縫出血者。清胃散。齒根腐爛血出

不止者。犀角地黄湯。牙宣出血。絲瓜藤燒灰搽效。牙挺出一二分。常咋生

牙日長出妨食名髓溢。白朮煎。牙癰由陽明熱毒。先制出血後骨

槽風名穿腮毒生耳下及項由小核漸大如胡桃齒齦腫痛牙關

緊急。用鷲翎探吐風痰內服黃連解毒湯。忌刀鍼點藥若腎元虛

牙齦宣露動搖宜大補。六味丸。又小兒牙疳口瘡其色通白及為

風疳蝕透。僵蠶炒黃去毛。齒齦忽出努肉。生地汁一盞皂角數片

晒研齒齦乃睡中上下齒相摩有聲由胃熱也。取木人臥席下塵

效。知齒離山食酸也。嚼胡桃。又齒齦腫。生多骨疽腫硬腐脫屬腎

虛腎主骨也。補中湯腎氣丸。骨脫後仍服補劑。若生他處。此皆齒

多服其骨自出。
依法治之。

所生病也。舌病多屬心。木舌由心經壅熱。舌腫大塞口。不能轉。

掉。不急治。殺人。黃連湯清熱如聖。外以鍼刺令血出。則腫消。再傳。

藥。龍腦破毒散。又礪砂重舌。亦由心火太盛。舌根下生。形如小舌。

口不能聲。飲食不入。急瀉心火。青黛散。內服黃連湯。外以鍼刺出惡血。以

末塗搽。舌菌生舌上如菌狀。色紅紫。多因氣鬱所致。舌症主方。

舌熱。舌下腫起核。舌熱。舌出不收。片腦末。應手而縮。產婦舌出不

收。硃砂敷。舌腫硬。血出如湧泉。蒲黃不硬但腫痛流血。涼血清脾。

黃。舌腫滿口。蒲黃。舌猝腫滿口如豬脬。不治殺人。醋調金底墨塗。

即。舌卷囊縮。為肝絕死。舌生胎。由邪氣傳裏。津液結搏。邪在表。邪

初傳裏。胸中之寒。與丹田熱火相激。則胎生而滑。迨寒變為熱。則

舌胎不滑而濇以熱耗津液滑者已乾也再熱聚於胃則胎黃至
熱已極則胎黑黑爲腎色病傳少陰若舌淡黑如淡墨乃腎虛火
炎爲無根之火若生芒刺皆由熱結川絹蘸薄荷汁揩之舌心絳乾胃熱心
營受灼也舌尖絳乾心火上炎也大紅點者熱毒乘心也白黃碎
點當生疳也胎如碱胃中宿滯也白如粉而滑邊色紫絳溫疫病
初入募原也舌無胎而有如烟煤隱隱者不渴肢寒陰病也黑而
短縮腎氣竭也黑而滑者水來克火爲陰症當溫之淡紅無色胃津
傷也多甘草湯

齒舌症脉候

尺脉洪大而虛主齒動疏豁右關洪數主木舌重舌

附方

通治

齒症主方

元參 山梔

丹皮 黃蘗

知母 車前子

白芍 甘草

熱甚加煨石膏

地骨皮

為君

炒黑升麻為佐

有風加荆芥

虛加杞子熟地

去山梔

利

穿腮毒

用消腫解毒之品

加紫花地丁甘菊

小便不利

甚效

煎劑內加六一散

犀角升麻湯

犀角三錢

升麻錢半

羌防各二錢二分

黃芩

白附子各六分

炙草四分

溫風散

歸芎 辛 芷 華撥 藥本 蜂房各一錢

溫風散

煎服

開笑散

白芷 細辛 良薑 華撥 川椒 香附 蜂房

等分

為末水煎含嗽

或擦之

涼隔散

見一卷中風

羌活附子湯

羌活 防 升 芷 黃蘗 有嗽加佛耳草

細辛

白芷

川椒

華撥

草烏

皂角

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

痛寒

溫邪 玉女煎 見一卷溫

痰火 二陳湯 見一卷中風

瘀血 加減甘露飲 見本卷口鼻

蟲痛 一笑散 川椒末 巴豆一粒 研成膏飯丸棉裹安蛙孔

蟲痛 定痛散 辛 芷 椒 藟 歸 地 翹 連 桔 草

實火 升麻石膏湯 荆 防 歸 芍 燈心 翹 桔 芩 草 升麻

虛火 滋陰抑火湯 歸 地 荆 防 丹 草 知 藥 蒺藜

腎虛 安腎丸 見五卷痺

胃火 清胃散 或作湯見本卷口鼻

腐爛 犀角地黃湯 見一卷溫

吹 人中白散 人中白 兒茶 黃蘗 薄荷 青黛 冰片

骨 黃連解毒湯 見一卷溫

風 仙方活命飲 見五卷鶴膝風

痛 六味丸 見一卷中風

腎 還少丹 見一卷中風

虛 補中湯 見一卷中風

多 腎氣丸 見二卷虛損

骨 黃連湯 連 梔 歸 芍 地 麥 草 犀角 薄荷

心 清熱如聖散 薄荷 連 芩 梔 柴 荆 枳 草 花粉

舌 琥珀犀角膏 人參 棗仁 燈心 茯神 各二錢 犀角 琥珀 冰片 一分 蜜丸 麥冬湯下

壅 熱 舌 木 熱 心 骨 多 中 補 虛 腎 虛 腎 痛 風 槽 骨 搽 吹

木舌

龍腦破毒散

盆硝四錢 蒲黃五錢 馬勃三錢 僵蠶

重舌

青黛散

連砂 冰片 牙硝 青黛 硃砂 雄黃 牛黃 礪

舌菌

舌症主方

木通 梔子 燈心 芎藭 升麻 麥蘗 草犀角 鬱痰加貝母

便秘加元明粉

舌墊方

荆防 辛芷 羌獨 陳香附 燈心

蒲黃散

螵蛸 炒蒲黃 研摻

涼血清脾飲

歸地 芩芍 防翹 草薄荷 石

炙甘草湯

見一卷中風

舌墊出血流傷

齒舌

王氏風熱牙痛用辛涼解散荆芥薄荷桔梗山梔防風赤芍甘草

二服愈

房兒胃火牙痛用石膏

煨研

開水沖服隨手而效

堂妹牙癰山情志抑鬱致患左下牙齦腫癢日久撐出多骨外科

用推車散不效腐孔血水淋漓近又寒熱食減神疲宜扶正爲

要用潞參茯神白朮當歸熟地山梔白芍

俱炒六七服效

劉舌根腫自用黃連瀉心兩旬後寸脉猶浮大舌邊紫泡咽腫

妨食耳痛乃上焦火風阻絡宜辛涼輕劑薄荷連翹桔梗山梔

鉤藤燈心苦丁茶葉菊葉竹葉心服愈

喉症論治 關喉痧附

喉以納氣而通於天。咽以納食而通於地。會厭筦乎其上。以司開合。惟其爲心肺肝腎呼吸之門。飲食聲音吐納之道。關係死生。爲害速矣。經云。一陰手少陰心。一陽手少陽三焦。結謂之喉痺。以君相二火經脈並係咽喉。熱結則腫痺。痺者閉也。閉則痰塞以死。將發先三日。胸必不利。一二日腫痛。三四日勢定有形。第三日必發寒熱。或頭痛兼風寒者。須疏散。察二便。其秘結係實火者。以重劑潤下。去其積熱。壯實者用硝黃。弱者但滋燥潤。腸虛者止蜜煎導法。大便秘行。乃可清利。上焦痰熱。清上若虛火便瀉。心脈數。腎脈微。宜滋陰降火。養金湯其症喉痺爲總名。有纏喉風。乳蛾。喉癰。喉瘤。喉疳。喉閉。蟬舌。喉柱等症。而纏喉風及

傷寒喉閉症為尤險。

喉痺

腫痛閉塞為風痰鬱火熱毒上攻之症。去風痰解熱毒自愈。咽

喉總絡係肺胃。急清此二經之熱。牛蒡湯外如惡寒寸脉小一

時患者皆同。為天行邪氣。宜先表散。其病之由來有二。一者少

陽司天三陽之氣。民病喉痺。仲景用桔梗湯。依陽毒施治。一者太陰溼勝火

氣內鬱。民病喉痺。又太陰在泉溼淫所勝。病喉腫喉痺。仲景用

桔梗依陰若不惡寒。寸脉大滑實。為陽盛陰虛。下之愈。酌用大

毒施治。其輕者可緩治。喉痺不可驟用寒涼。以痰實結胸遇寒不運。

漸至喘塞不治也。其氣急閉塞欲死者。緩則立愈。或馬蘭根苗

搗汁。和醋含漱。急則用吹法。礞砂膽礬末。吹患處。或上法。搗皂角水灌

皂角末吹鼻噴嚏。亦開。上法。或新設水

唐雄黃灌入即吐。或鍼法用砭鍼於腫處刺血出。若口紫鍼不
效。或刺頂心頭髮一扎。力拔之。其喉自寬。又有陰虛陽浮痰結
愈。或上脉浮大重取或濇者。作實症治。必死。加減八味丸。喉痺連項腫。

毒飲。

風喉

喉腫大連項痛。喉有紅絲纏緊。且麻且癢。指甲青。痰壅肢厥。

由平時多怒。兩日前胸不利。痰塞氣促。症最急。過一日夜目直。

視齒噤。喉響燈火近口即滅。此氣已離根。不治。治法如喉痺。金

碧二升頻吹。內針法。手足冷以水溫之。鍼照海然谷四穴。使血

加牛黃。效更速。出如珠。若刺少商穴。血出散而不收者。不

治。照海穴在內踝下四分。輭骨陷中。然

乳蛾

有單雙。有連珠。單輕雙重。多因酒色鬱熱而生。單蛾生會厭一

須證治裁

卷之六

喉

三

邊一日痛。二日紅腫。三日有形如細白星。發寒熱者凶。吹藥先用碧丹

五金丹一。後用金丹二。俟大便秘。行自痊。如至三日喉中但紅腫。

無細白星。卽是喉癰。宜辨雙乳蛾。生會厭。左右兩邊俱有細白

星。藥照前用。左屬心。右屬肝。煎藥於主方內。左加犀角。右加赤

柴。雙蛾則兼用之。大便秘加明粉。枳殼元連珠蛾二白星上下相連。

用藥照前。或外用成吹藥加冰片吹之內服三黃桔梗湯。

爲虛火上炎。肺受燥熱。致咽喉生紅絲。如哥窰紋。如秋海棠葉。

背紋。乾燥而癢。阻礙飲食。雖不喪命。不能速愈。吹用碧丹。膏化

症主方加。上具母。須戒憂怒。酒色。忌鹽醬。及一切動風助火之物。一月

可愈。

喉癰紅腫而痛。別無形狀。因過食辛辣炙博厚味而發。症屬胃大腸

二經。重則寒熱頭痛。犀角地黃湯吹用。四五日可愈。若鼻中出

攻膈。不治。

喉因憂鬱氣滯血熱。婦人多患之。狀如浮萍畧高。而厚色紫生喉

旁。初起吹碧丹九。金丹一。後用金丹輕則半月。重或經月亦須

守戒忌口。

腫舌肥人感熱性躁者多患此。犀角地黃湯加。但須吹至舌根下

兩旁。時刻勿間。喉內吹用碧丹亦須勤吹。凡舌下小舌爲蟬舌。

連喉腫痛。卽爲喉癰。不痛者非癰。大約蟬舌兼喉癰而發。十有

六七。其勢凶。煎藥多加黃

連山梔犀角。

喉

喉傷寒後發為氣閉不通無形無聲難治喉項強硬目睛上視故多不治

喉極痛腫甘桔射干湯外熱燒鹽散

此外又有咽隘痛由陰虛火炎者喉痺飲倍有喉中結塊飲食不

通者百靈丸重者不過二丸有懸癰喉痛生上膠有紫泡如豆大川簪腳風挑破血出愈或口疳藥吹亦可

熱上搏者啓關散有懸癰垂長咽中煩悶者枯礬鹽花研細有喉中箸頭點上去涎

生肉者棉裏箸頭蘸鹽有梅核梗塞咽中咯不出嚥不下因於七

情鬱結者四七湯有喉痛因於相火用涼藥不愈者六味丸加桔梗元參知母

黃有風火上鬱咽痛頭脹項腫當用辛涼者滑石連翹杏仁桑皮西瓜翠衣近世

咽喉痧最重初起憎寒壯熱咽痛渴煩先宜解表務令透達或兼

清散若驟服寒涼外邪益閉內火益焰咽痛愈劇潰腐日甚矣至

丹痧透發已無惡寒等症。則宜寒涼泄熱。不宜雜進辛散煽動風火。致增腫腐。必至滴水下咽。痛如刀割。蓋此症由威風火溼熱時邪而發。治法因風熱者主清透。普濟消毒飲去升麻柴胡。因溼熱者主清滲。湯加枯蘆通草燈心。因痰火凝結者主消降。清氣化痰丸去半。邪達則痧透。利膈湯清咽。痧透則爛止。太平丸選川。然症有可治不可治。其口氣作臭。喉色淡黃或深黃者。係痰火所致。皆可治。若爛至小舌及鼻塞目閉。元氣日虛。毒氣深伏。色白如粉皮者。皆不可治。其愈後四肢痠痛。難於屈伸者。由火灼陰傷。絡失所養。宜進滋陰。勿與痺症同治。

驗症訣

尤氏曰。凡喉痺屬痰。喉風屬火。總因火鬱而兼熱毒。致生乳蛾等

症治法去風豁痰解熱開鬱其症自詮若喉症初起寒戰發後身涼口不破碎又無重舌二便俱利不可悞認熱症皆由陰氣虛寒而發其痰卽精神所化不宜去盡先以藥吹之使咽喉通卽便服藥首劑發散和解第二宜溫補若三四日後再發寒戰或心痛骨脇肋痛半屬難治發時牙關緊急喉舌俱痛腫口碎而臭或有重舌或舌上起黃屑發後下午再發寒熱二便閉者卽是熱症用石膏排毒散治之如起三四日後而寒熱者其症雖凶無害惟症未減牙關反不緊急不腫脹如無病人不治或舌腫滿口如胡桃如茄子並不治如以箸按舌則起白色去箸則生紅紫此其身內之血已死又或口有臭氣口渴氣急而多稠痰如桃膠者一頸俱紅

腫者紅帶紫而青帶白神氣短少者不語者面色少神愛坐低處者喉症無痰者傷寒患連珠蛾及喉閉者小兒口疳臭爛而黑者舌下紫筋下通於腎色白而腫者皆不治

附方

清上丸

熊膽 雄黃 壓舌下化之 見一卷失音

薄荷

青鹽

硼砂

膽礬

蜜丸

養金湯

升麻 牛蒡 桔梗 甘草 黃藥子 元參 紫背浮萍 花粉

牛蒡湯

升麻 牛蒡 桔梗 甘草

黃藥子

元參

紫背浮萍

花粉

通隘散

硼砂二分 兒茶 青黛 滑石 寒水石各一分 研吹

桔梗湯

桔梗 甘草各三錢

半夏甘桔湯

夏

桔 草

下火喉閉補虛喉痺喉疳
小承氣湯 見一卷溫

喉痺散 荆 芫 桔 貝 草 元參 薄荷 殭蠶 前
胡 花 粉 款 冬 燈 心 散 亦 作 飲

加減八味丸 八味丸見一卷中風 此加五味 減附子

芩連消毒飲 卽普濟消毒飲見一卷痰

喉痺急方 火硝五錢 硃砂錢半 蒲黃一錢 冰片 兒
茶各五分 珍珠一分 烏末吹喉大吐痰涎數

管卽愈并治口疳
牙疳牙關緊閉者

十寶丹 梅 礬 薄 荷 兒 茶 各 一 兩 甘 草 五 錢 乳 石 三
錢 血 竭 珍 珠 琥 珀 各 二 錢 冰 片 三 分

梅礬取大青梅切下圓蓋去核將礬研細入梅覆用圓蓋以
竹釘釘好炭火煨之去梅取礬輕白如膩粉味極平酸收貯

聽用 此方凡
喉口症皆可效

金鎖匙 火硝錢半 硃砂五錢 殭蠶一錢 冰片一分
雄黃二錢 研吹再刺少商穴

吹藥

碧丹煉礬末三分 牙硝各三分 百草霜 礬砂各五分 薄荷

煉礬法 明礬研細傾入銀罐內小半罐 入爐用浮炭火煨

煨以銅箸入擾無礬塊為度即將研細鎗硝投入礬內十分

之三次將細研白礬砂投入亦十分之三 少頃再投生礬末

逐漸投下候礬煨盡照前投硝礬少許 遂漸投完待礬鋪出

罐口高如饅頭而止加炭燒至礬枯乾 乃用瓦片覆罐上一

時取起將半黃少許為末以水五六匙調滴礬內 將罐

仍入火烘乾取罐覆淨地上七日收貯 煉礬須輕鬆無豎紋

者作此即名玉丹 最貴多製時候愈久愈妙

煨燈草灰法 陳肥白燈草鋪桌上噴溼 將筆套用水溼管

以溼紙塞緊一頭將溼燈草捏入管內 以竹箸築實再以溼

紙塞口入炭火煨之 烟盡為度取出置地上碗蓋之 去管口

紙取灰黑成團者佳煨時勿令筆套炮碎 碎則不堪用不可

太過過則灰白無用不可不及不及則不成灰 而不可用此

丹最輕煨時又難得法 須平日多製得用可也此即名元丹

取百草霜燒茅柴者佳須近鍋底者用 若鍋心及鍋口邊

者不用須刮去面上一層取中間用之著鍋者亦無用

配藥法 即碧丹每煉礬三分加百草霜半匙研細次入燈

草灰一厘研勻如瓦灰色可入甘草末三匙薄荷末三分 硃

再入冰片半分研勻入磁鉢塞口勿令出氣此丹須當時配合如遇五日卽不堪用若遇陰雨一日卽無效如欲出痰加牙皂末少許吹之

喉癰及單乳蛾輕症單用碧丹又名青藥卽效若遇重症須兼黃

藥卽金丹凡初起令病者低頭開口溜出痰涎初起用青

藥九分配黃藥一分吹過五管次用青八黃二再次用青七

黃三如症重青黃藥兌半用至吹五次痰涎必不壅然後用

青四黃六若症重甚用黃八青二尤效青藥消風痰解熱

毒性尙緩不及黃藥消腫除熱開喉痺出痰涎爲效然初起

黃藥不可多用因其直走入內與病不八也

金丹卽黃藥蒲黃二分 硝九分 硼砂 冰片 薄荷

吹藥

葉末各一分

製硝法 馬牙硝長白厚大者溫湯洗過棉紙挹乾仍用紙包好放灶上明管洞內自乾白如霜
配藥法 卽金丹每牙硝一錢蒲生用四分研細次下鹽蘇炙末一分牙皂末一分半共研極細如淡鷲黃色加冰片一分研勻此藥可留久
惟冰片臨時加用可耳

金丹能消腫出痰若遇牙又蟻舌穿牙疔端用此治之如咽喉症則兼用青藥看症輕重用之症重者再加牛黃如喉痺及纏喉風加僵蠶牙皂餘只用牙硝硼砂薄荷蒲黃冰片卽可

喉症卽重三日前未成膿藥能消散五日膿成穿破必爛成窠爛處須用口疔藥多龍骨珍珠

口疔藥 薄荷葉研細三分 兒茶末二分半 製黃蘗末一厘 龍骨末二厘 白芷末如腫痛用三四厘如不

吹喉

通治

藥

腫痛用二厘半生甘草末用五厘珍珠末五厘冰片
三厘研勻裝餅封固凡遇口瘡及各種口瘡皆效
若初起腫而熱甚者多加薄荷冰片取其辛涼發散也若患
不腫熱甚而痛則以長肉藥為主

長肉藥即前口疳藥多用兒茶末龍骨末配成紫色
此方專治喉症口瘡者若用此治走馬牙疳穿牙

毒小兒胎毒口疳則本方加牛黃倍珍珠如黑爛者不
治至疔痘後口瘡非此不除則去黃蘗龍骨加牛黃

五厘末六厘倍珍珠

喉症煎藥主方牛蒡子炒研前胡銀花連翹山梔
甘草枯苓炒黑元參桔梗花粉

薄荷燈心泉水煎如發寒熱加柴胡頭痛加石膏
胸悶加枳殼鬱熱而發加赤芍貝母口渴加麥冬

蜜調藥佐薄荷葉末為君陳韓為臣甘草末為使先將煉礬百
草霜研和入燈草灰再研後人薄荷貝母冰片研

勻成青灰色用白蜜調此方專治喉癰喉疳時刻咽喉內

連珠蛾

服喉症煎藥主方
此方一名青靈膏

成吹藥

硼砂一分
木藥三分

兒茶二分

龍骨五分

青黛一分
再加膽礬

麝香

青黛

本識者

珍之

三黃桔梗湯

芩連藥梔
元參水煎食後服

勞

芍

桔

草

薄荷

犀角地黃湯

見一卷溫

連珠喉瘡

廿桔射干湯

桔梗二錢
射干

山荳根

荆防

加竹葉

十四片

燒鹽散

取橡斗大者實鹽滿壳燒存性以碗覆地入

麝香

喉林結塊

百靈丸

百草霜

蜜丸芡實大水化服

風熱梅核梅相火風熱溼熱痰火痧爛痧爛喉痺

啓關散 牛蒡子 生甘草 水煎

四七湯 陳 苓 夏 樸 檳 蘇 青 枳 羌 麴

喻化丸 冰片 射干 鍾乳粉 升麻 牙硝 黃耆 大

六味丸 見一卷中風

普濟消毒飲 見一卷痰

甘桔湯 見本卷頭痛

清氣化痰丸 星 夏 陳 枳 杏 蕁 芩 苓 薑 汁

利膈湯 銀花 荊 防 芩 桔 連 梔 麴 勞 薄

清咽太平丸 芎 防 桔 草 林 硝 粉 草 犀 角 柿 霜 蜜

玉液上清丸 薄荷十四兩 柿霜五兩 桔梗四兩五錢 百藥煎伍

牙疳

吹喉

敷藥

錢 防風一兩六錢 砂仁四錢五分 青黛三錢 冰片
元明粉 白礪砂各二錢 研細蜜丸 芡實大 每服一丸
噙化不拘時候 治風痰上壅 頭目不清 咽喉腫痛 口舌生
瘡 服之生津 液化痰涎 昔宋神宗患喉痺 服此藥一丸立
愈

犀角丸 犀角 粉草 撲硝各二錢 桔梗一兩 赤茯苓
生地 連翹 牛蒡子 元參各五錢 青黛一錢

蜜丸 龍眼大 每一丸薄荷湯下

三仙散 膽礬六分 牛生半炒 廣木香三分 熊膽三分
其研極細 用番木髓一個 磨碎和勻 吹在患處 治

喉風口噤 死在須臾 以箸

開口吹入即愈
牙疳方 婦人溺桶中白垢火煨一錢 銅綠三分 麝香
分五厘 各研和勻 敷上立愈

喉

房姪舌下地丁左畔畧腫誦讀勞倦則發渴頰紅腕悶痰稠呼吸不利脉沈少力或進寒涼藥腹痛食減此素稟陰氣不足神勞則五志火動脾氣困倦故痰氣壅而成痺也經言一陰一陽結謂之喉痺一陰少陰君火也一陽少陽相火也二經之脉夾咽循喉火動痰升結而不散其源總由腎陰素虛水不制火使然用六味丸熟地砂仁末拌蒸丹皮酒炒加參麥貝膝藕粉蜜丸服而平尹氏久患梅核氣塞如梗妨咽不利非火非痰乃氣鬱爲患用鬱金木香貝母桔梗陳皮枯蘗皮甘草數服效

胸痺論治

胸痺胸中陽微不運久則陰乘陽位而為痺結也其症胸滿喘息短氣不利痛引心背由胸中陽氣不舒濁陰得以上逆而阻其升降甚則氣結欬唾胸痛微背夫諸陽受氣於胸中必胸次空曠而後清氣轉運布息展舒胸痺之脉陽微陰弦陽微知在上焦陰弦則為心痛此金匱千金均以通陽主治也金匱云胸痺喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沈遲關上小緊數栝實薤白白酒湯胸痺不得卧心栝實薤白半夏湯胸痺氣結胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯胸痺氣塞短氣茯苓杏仁湯胸痺緩急者薤白附子散心中痞諸逆心懸痛桂枝湯薑枳心痛微背背痛微心烏頭赤石脂丸千金治胸痺連背痛細辛散胸中

逆氣心痛徹背。少氣不食。前胡湯。胸中滿噎塞。喉燥唾沫。橘枳生薑湯。應治中。胸背閉滿。上氣喘急。下氣湯。胸背疼痛。熨背散。大約陽微者用甘溫。苓桂朮湯。陰凝者用溫通。理中湯。飲逆者用辛泄。吳茱萸湯。痞阻者用辛滑。枳實薤白湯。喘逆者用苦降。桂枝加茯苓杏湯。痺久者兼通絡。旋覆花湯。只在旋轉上焦。清陽疏利。膈間痰氣不與胸痞結胸等症混治。則得之矣。

喻嘉言曰。胸中陽氣如離照當空。曠然無外。設地氣一上。則窒塞有加。故知胸痺者。陽氣不用。陰氣上逆之候也。然有微甚不同。微者但通其不足之陽於上焦。甚者必驅其厥逆之陰於下焦。仲景通胸中之陽。以薤白白酒。或枳實半夏。桂枝枳實厚朴。乾薑白朮。人參甘草。茯苓杏仁。橘皮。選用對症。

三四味即成一方。本但苦寒盡屏，即清涼不入，蓋以陽通陽。陰藥不得預也。甚者用附子烏頭川椒大辛熱以驅下焦之陰而復上焦之陽。補天浴日，獨出手眼。世醫不知胸痺為何病，習用豆蔻木香訶子三稜神麴麥芽等藥坐耗其胸中之陽，其識見亦相懸哉。

胸痺脉候

脉陽微陰弦，即胸痺痛。金寸口脉沈遲，關上小緊數，陽衰胃以上陰寒結聚。

附方

陽微

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌

薤白

白酒

不

栝蒌薤白半夏湯

薤

薤

酒

半夏

飲邪虛寒利肺疏胃復陽痞逆溫填溫散下氣理氣

枳實薤白桂枝湯

枳實 薤白 桂枝 厚朴

人參湯

人參 朮 薑 草

茯苓杏甘湯

茯苓 杏仁 甘草

橘枳生薑湯

橘皮 枳實 生薑

薤苳附子散

薤白 附子

桂枝薑枳湯

桂枝 薑 枳

烏頭赤石脂丸

烏頭 赤石脂 烏頭 附子 乾薑 川椒

細辛散

細辛 甘草 各六錢 枳實 薑 薤 地 朮 各一

前胡湯

前胡 夏 芍 草 各二錢 參 歸 苓 各一錢

治中湯

見三卷飲食

下氣湯 杏仁 檳榔 童便煎

下氣湯 杏仁 檳榔 童便煎

熨背散 烏頭 桂 附 羌 辛 芍 椒 爲末綿裹烘

荅桂白朮甘草湯 荅 桂 朮 草

理中湯 見一卷中風

吳茱萸湯 見三卷嘔吐

桂枝加朴杏湯 桂 芍 草 撲 杏 薑 棗

旋覆花湯 旋覆 葱管 新絡

胸痺

趙 有年胸痺食阻由舉重傷氣所致脈小弱是陽結欲閉之候
述數月前膈痛飲糜粥輒阻自謂膈噎已成今作胸痺治通其
脘中欲閉之陽參金匱法栝蒌薤白桔梗杏仁橘白丁香用辛
滑溫通胸脘俱爽食入不拒竟進粥飯然病初愈恣意粉團乾
飯非高年祝噎所宜

馬 病後脈弦胸痛金不制木當節勞戒怒栝蒌薤白白芍茯神
杏仁炙草煨薑二服愈

糜氏中年脘痞食減不飢吐沫漸成胸痺乃上焦氣阻腑失通降
治者以爲噎膈常用朮附薤樸燥脾破氣劫津漸致陰傷液涸

大便不通下焦壅則上焦益加脹滿恐延關格重症矣宜辛通
苦降法棗仁杏仁郁李仁貝母枳壳蘇梗鬱金汁薤白汁五七
服胸膈舒大便潤而食進

金氏諸陽受氣於胸中喻氏謂胸中陽氣所經如離照當空曠然
無外設地氣一上則晦塞有加今脫閉食脹清陽不旋濁氣失
降午後足腫陽益下陷矣用升清降濁桔梗半夏橘白升麻砂
仁壳枳壳茯苓加薑棗煎服愈

趙脈緩胸痺陽氣不舒用苓桂朮甘湯加砂仁壳數服效

蔣胸右偏痛呼號欲絕日夕不能臥醫初疑胃氣疏香燥破氣
方不應改用乳香當歸延胡靈脂山氣分兼入血分乃益痛更

謂心痛徹背于問咎嘔吐否曰未也予謂痛不在心胃乃胸痺耳症由胸中陽微濁陰上千仲景治胸痺喘息短氣用枳實薤白白酒湯通陽豁痰復加半夏正合斯症仍加橘紅一啜遂定

心痛論治心痛心癰附

心當歧骨陷處居胸膈下胃脘上心痛與胸脘痛自別也心爲君主義不受邪故心痛多屬心包絡病若眞心痛經言旦發夕死夕發旦死由寒邪攻觸猝大痛無聲面青氣冷手足青至節急用麻附乾薑溫散其寒亦死中求活也若五臟之邪干心包致痛必應散之屬經云邪在心則心痛喜悲時眩仆此包絡受邪在腑不在臟也經云手少陰之脈動則病盛乾心痛渴而欲飲此言支脈受邪在絡不在經也經云厥心痛與背相控如從後觸其心偃僕者腎心痛也神保九腹脹胸滿胃脘當心痛上支兩脇胃心痛也草豆蔻丸清熱解鬱湯如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也訶子散復色蒼蒼如死元通氣散

狀終日不得太息肝心痛也。金鈴子散加紫降香卧若徒居心痛間動作痛
益甚色不變肺心痛也。七氣湯加枳壳鬱金。腎厥心痛由陰火
中焦寒逆肝厥心痛由火鬱血。經之論厥心痛以諸痛皆肝腎氣
分肺厥心痛由上焦氣分不調。逆上攻致之但分寒熱二種寒厥心痛者身冷汗出手足逆便利
不渴心痛脈沈細。求附熱厥心痛者身熱足厥煩躁心痛脈洪大
金鈴子散。凡暴痛非熱久痛非寒宜審經又云陽明有餘上歸於
清鬱湯。心滑則病心痛。生韭汁和五苓散小茴香煎湯。心痛引少腹滿上
下無定處洩便難者取足厥陰肝心痛腹脹噉然大便不利取足
太陰脾心痛短氣不足以息取手太陰肺心痛引背不得息取足
少陰腎以上皆他腑臟之邪干心而致痛須加各腑臟藥治之金

匿云九痛治九種心痛醫通曰九種心痛乃久客之劇症即腎水

乘心肺氣攻心等別名也痛久血瘀陰邪團結故用參附乾薑溫氣散

邪加狼毒巴霜驅之使從陰竅出藥雖峻利而改湯為丸取緩攻

不取急蕩也後人因分九種心痛曰飲惡心煩悶嘔水山停飲蓄

注也則小胃湯甚曰食飽悶噫敗卵氣由生冷食物過多也青皮九

曰寒外受寒宜溫散桂枝七內受寒宜溫利求附湯加寒久鬱則

成熱川山梔為熱藥衛道佐虛寒宜溫補歸脾湯加乾薑腎寒乘心

痛則心懸如飢泄痢下重五積散寒客背俞則脈血滯注於心相引

痛桂枝七氣曰火痛不時發薑汁炒山梔少若熱鬱痛脈數口渴

便秘清中曰氣脈沈結或弦胸中氣壅攻刺服痛沈香降中氣虛

按之則痛定。

二陳湯加炮薑。不應理中湯。

久服破氣藥太過。脈大無力。

六君湯加炮薑。

曰血好飲熱酒。血留胃口。脈必瀉。或訛飲作呃。

手拈散加桔梗。虛人梗開提其氣。

血瘀。四物湯加桃仁。穿山甲。桂心。降香。

曰悸。心痛而煩。發熱動悸。此為虛傷。

辰砂妙香。

散加味。

曰蟲。面有白斑。唇紅。口沫能食。

剪紅。

因虬動則嘔。痛有休。

七氣湯。

曰疰。鬼疰。心痛皆憤妄言。或猝倒口噤。由感惡也。

蘇合香。

此為九種心痛。若心痛脈微欲絕。手足逆冷者。

桂心三錢煎服。猝心痛脈。

洪數者。

黃連三錢煎服。若脈弦數。木克土也。

小建中湯取芍藥。酸收於土中。海木如脈沈細。

水侮土也。

理中湯取乾薑味辛。於土中洩水。

大寒客心胸。嘔逆不食。氣上衝痛。不。

可觸近。

金匱大寒痛綿綿不絕。

求附湯加草果厚樸。凡按之痛減者。氣虛也。

散。

按之痛甚者。氣實也。

梔黃丸。

又有心瘕。發胸乳間。一名井疽狀。

如豆大發如蜂巢係心熱盛宜疏導心火涼血飲緩則不救小便澀

者清心散或涼膈散去硝黃大便秘者內固清心散涼膈散去硝黃加白芷花粉木通瞿麥

丹溪曰心胃痛須分新久若明知身受寒口食冷物而得其初當

與溫散如桂枝七氣湯或溫利之如九痛丸若得之稍久則成鬱鬱久必生熱

熱久必生火若溫散溫利即助火添邪由是方中以山梔為熱藥

之嚮導則邪易除正易復痛易安又曰心胃痛須用劫藥痛乃止

如倉猝散山梔四十九枚連皮炒大附子一个炮去皮臍其為粗末每三錢水一盞酒半盞煎七分入鹽少許服加川芎

尤能治氣自腰腹間攣急疼痛不可屈伸痛不可忍自汗如洗手

足冷而垂死者又如愈痛散五靈脂延胡索蓬朮良薑當歸等分為末每二錢醋湯調服治急

心胃痛

心痛脈候

心脈微急為痛短而數或瀉皆心痛浮大弦長者死沈細者生胃
脈微滑為痰飲滑實為宿食沈緊為冷積沈瀉為氣滯數為火弦
瀉或芤為死血忽大忽小為蟲痛甚脈必伏心痛在寸腹痛在關
下痛在尺。

附方

必應散 延胡 香附 艾灰 歸身 砂仁 生薑

神保丸 全蠍七個 巴霜十粒 木香 胡椒各二錢半

草薢丸 枳殼二兩 草薢煨 白朮各一兩 麥芽 神麴
半夏各五錢 乾薑 青陳各二錢 炒鹽五分

清熱解鬱湯 山梔錢半 枳 芎 香附各一錢 黃連
蒼朮各七分 陳皮 薑炭 炙草各五分

通治 胃痛 胃痛 胃痛 胃痛 胃痛 胃痛 胃痛 胃痛 胃痛 胃痛

肝心脾 同上 肝心脾 同上 肝心脾 同上 肝心脾 同上 肝心脾 同上 肝心脾 同上 肝心脾 同上 肝心脾 同上 肝心脾 同上

片

河子肉湯 見四卷痢

復元通氣散 白朮二兩 炙甲片 荷香炒各一兩五錢 陳皮 延胡 炙草各一兩 木香五錢

末 每服二錢 煎湯下

金鈴子散 見三卷鬱

七氣湯 見二卷欬嗽

朮附湯 朮 附 草

清鬱湯 陳 夏 蒼 桂 連 枳 實 木 香 各 一 兩 五 錢 川 芎 六 分 炙 草 三 分 薑 三 片

五苓散 見一卷溫

九痛丸 附子三兩 藥 實 人 參 炮 薑 四 兩 各 一 兩 狼 毒 五 錢 蜜 丸 附 子 大 溫 酒 下 三 五 九

飲痛飲痛飲痛飲

胃苓湯

見一卷中風

小胃丹

芫花和丸

甘遂

大戟

大黃

黃藥

以白朮煎

青皮丸

青皮

山查

神麴

麥芽

草果

桂枝七氣湯

七氣湯

見二卷欬嗽

此加桂

芍

參

歸脾湯

見二卷勞瘵

加減五積散

見一卷淫

神效散

青芽

陳枳

麴

桂芍

草

芷

小香

麥

華澄加各三分

延胡

補骨脂各七分

丁香

清中湯

連

梔

陳

苓

夏

草

草

薏

沈香降氣散

見三卷鬱

有痰中虛補虛血痛血痛悸痛悸痛蟲痛蠅痛蠅痛

二陳湯 見一卷中風

理中湯 見一卷中風

六君湯 見一卷中風

手拈散 延胡醋炙 五靈脂醋炒 草薢 沒藥 每服三錢 酒下

四物湯 見一卷中風

辰砂妙香散 見四卷健忘

加味七氣湯 七氣湯加遠志 炙草各五分 茯神 菖蒲 各錢半 蕪荑 棗 雄黃 木香 檳榔 乾漆 陳皮 大黃 貫仲 糊丸米湯下

剪紅丸 見三卷嘔吐

烏梅丸 見三卷嘔吐

妙應丸 見三卷積聚

心痛

痛症

蘇合香丸

見一卷中風

和胃

小建中湯

見二卷呷血去黃耆

寒嘔

大建中湯

見三卷積聚

氣虛

參朮湯

參朮

薑三片

陳草

或加炒蚌粉二錢尤妙

砂仁

丁香各二

氣實

梔莢丸

山梔

一兩半

吳萸

香附各二錢五分

生薑湯

心癰

涼血飲

荊麥

芷地

麥

芍

梔

翹

草

木通

瞿

竹葉二

十片

薄荷

花粉

車前子

各八分

燈心

十條

瀉瀉

清心散

地芍

麥

草

遠志

赤苓

知母各一錢

便瀉

涼膈散

見一卷中風

甘草

人參

硃砂

赤苓

雄黃

藜豆

麝香各

便秘

內固清心散

白蔻

甘草

皂角各一錢

冰片

麝香各

雄黃

藜豆

麝香各

雄黃

心痛胃痛 心胃通治

一分 每服 一錢

倉猝散 山梔連皮炒四十九枚 大附子一个炮去皮臍 爲末 每三錢水二盞酒半盞煎七分入鹽少許服

加川芎 尤妙

愈痛散 每五錢脂 延胡 蓬朮 良薑 當歸 等分爲末

心頭痛方 烏梅三個 元棗三個 杏仁七個 麝香一字 搗如泥 黃酒一杯煎 溫服

胃脘痛論治 胃脘痛附

胃脘當心下主吸受飲食。若煩勞冷熱致氣血痰食停滯作痛。或肝氣犯胃及腎寒厥逆皆能致之。症與心痛相似。但胃脘痛必見胃經本病。如脹滿嘔逆不食便難面浮肢倦與心痛專在包絡者。自別治法。須分新久。初痛在經久痛入絡。經主氣絡主血也。初痛宜溫散以行氣。久痛則血絡亦痺。必辛通以和營。未可概以香燥例治也。其因胃陽衰而脘痛者。食入不運。當辛甘理陽。香砂六君。良因肝乘胃而脘痛者。氣衝脇脹。當辛酸制木。吳萸白芍青皮木。蓋因腎寒厥逆而脘痛者。吐沫嘔涎。當辛溫泄濁。瓜厚樸延胡金橘。而脘痛者。得食稍緩。當甘溫和中。小建。因客寒犯膈而猝痛者。嘔

逆不食。當溫中散寒。大建中湯。加白薤仁。積寒致痛。縣縣不絕。無增無減。當

辛熱通陽。厚樸草薤。加火鬱致痛。發則連日。脈必弦數。當苦辛泄熱。

薑汁炒黃連。山梔。瀉火為君。香附。川芎。陳痰積。腕痛必嘔惡。清中

皮枳壳。開鬱為臣。反佐炮薑。從治為使。痰積腕痛必嘔惡。湯加

海石。南。停飲。腕痛必吞酸。胃苓湯。食滯腕痛必嘔腐。加香砂枳木丸

氣鬱腕痛必攻刺脹滿。沈香降。傷力腕痛必瘀血停。加鬱金。歸尾。

或手怒氣腕痛必呃逆胸痞。半夏瀉。虻動腕痛必有休止。安虻痛

久不愈必入血絡。歸鬚桃仁。延胡紫。若痛而肢冷。脈微欲絕。桂心

甚。凡痛有虛實。按之痛止者為虛。按之痛反甚者為實。虛者參朮

實者九。梔黃。痛甚者脈或伏。用藥不宜守補。參耆朮。地之屬。以痛則不通。通

則不痛故也。若膈間腫痛。不能進食。但喜水飲。或咽腫。人迎盛而

氣口緊者當作胃脘瘕治

胃脘瘕

由熱毒攻聚胃口而發。靈樞經曰。中脘穴屬胃。隱隱痛者胃

脘瘕也。聖濟總錄曰。胃脘瘕。不比肺瘕之可認。苟不嘔膿血未

免他誤矣。其症氣逆於胃脈。必沈細。或陽氣為風寒所遏。不得

上升。人迎必盛。人迎者胃脈也。盛則熱矣。診得此脈。即胃脘瘕

之候。其人必寒熱如瘧。身皮甲錯。欬嘔膿血。若脈洪數。則膿已

成。急宜排膿。如脈遲緊。乃屬血瘀。急當議下。否則毒氣內攻。腸

胃并腐。如初起寒熱如瘧。欬吐膿血。射干湯。若風熱固結。唇口咽

動。薏苡仁湯。積熱不散。清胃散。毒成未潰。內消沃雪湯。未潰毒盛。東垣托裏散。

胸乳間疼。吐膿腥臭。牡丹散。若在膈下。膿出大便。排膿湯。膿稀。太乙膏。

虛者。八珍湯加黃
耆。忍冬。連翹。

胃經穴人迎在結喉兩旁動脈應手其脈見於左手人迎盛則熱
聚胃口為癰肺癰欬膿如米粥胃癰但嘔膿以其結聚胃脘從溼
化也凡舌胎經久不退色黑垢膩口甜氣穢即胃脘發癰之候。用
膈散加石
斛連翹。下盡宿垢再以保元湯
加荖。橘。調理可安。

胃脘痛脈候

弦為痛。濇為痛。胃脈微滑為痰飲。滑實為宿食。沈緊為冷積。沈濇
為氣滯。數大為火。乳弦為血。忽大忽小為蟲。沈小者生。實大浮長
者死。

附方

陽衰肝乘

香砂六君湯 六君加 木香 砂仁

枳壳煎 枳壳汁五匙 烏藥汁七匙 白芍汁二十匙 木香汁五匙 砂仁五分 二味煎

諸汁服之

吳茱萸湯 見三卷嘔吐

小建中湯 桂 芍 草 薑 飴 棗

大建中湯 見二卷汗

朮附湯 見五卷瘕

清中湯 見本卷心痛

胃苓湯 見一卷中風

左金丸 見一卷火

腎厥煩勞客寒積寒火痰飲痛肝火

食痛

香砂枳木丸

見本卷頭痛

氣鬱

沈香降氣散

見三卷鬱

血滯

手拈散

見本卷心痛

痞痛

半夏瀉心湯

見一卷溫

動虻

安虻湯

見三卷嘔吐

絡痛

失笑散

靈脂

蒲黃俱炒

等分水酒煎

虛痛

參朮散

參

朮

草

實痛

梔莢丸

山梔

吳茱

初起

射干湯

射干

去毛

山梔

赤茯苓

升麻

各一錢

赤芍錢

熱風

薏仁湯

薏仁

防己

赤小豆

炙草

等分

五分

白朮

五分

煎去渣

入

地黃汁

一

合煎服

清胃散 見二卷 衄血

芍藥湯 赤芍 石膏 犀角 麥冬 木通 朴硝 薤白

內消沃雪湯 歸芍 元參 甘草 薤白 正 貝 陳 乳 沒 甲片 銀花各五分

水酒 煎 東垣托裏散 銀花 當歸各二錢 大黃 牡蠣 花粉 黃芩各

四分 水酒 連翹 朴硝各六分 赤芍 黃芩各

牡丹散 丹皮 地榆 薤仁 黃芩各錢半 赤芍 桔梗

排膿湯 湯或作散 見二卷 肺癰 敗醬各一錢

太乙膏 地 芍 歸 正 桂 元參 大黃各二兩 麻

八珍湯 見一卷 中風 油二助 熬去渣再熬下黃丹

補調 稀膿 遺己 臭膿

順證治表 胃脘痛 諸

嘔膿調補

涼膈散

見一卷中風

保元湯

見一卷火

胃脘痛

房叔胃脘痛脈細滴服香砂六君湯去白朮加煨薑益智痛定後遇勞復發食鹽炒蠶豆時止時痛予謂昔人以諸豆皆閉氣而蠶豆之香能開脾鹽之鹹能走血痛或時止知必血分氣滯乃用失笑散一服痛除

巢氏素有胃氣或用溫胃之劑不效延至痛引背腸脈短滿予謂短爲宿食滯爲氣中血滯宜疔痛無已也用延胡五靈脂酒炒當歸紅薤降真香末痛止

史胃脘痛日久血絡亦痺理用辛通當歸續延胡索橘絡香附枳壳降香鬱金汁服效

張 操勞傷陽脈遲小胃口隱痛縣縣不已治用辛溫理氣製半

夏良薑金橘皮茯苓檀香歸鬚韭子炒研一吸痛止

薛 痛久熱鬱口乾內煩不宜香燥玃液詢得食痛緩知病在脾

之大絡受傷由忍飢得之甘可緩痛倣當歸建中湯法炒白芍

二錢半當歸錢半炙草錢一豆豉炒錢半橘白八分糯稻根鬚五錢飴糖熬三錢半

數劑痛定常時食炒粳米粥嗣後更與調養胃陰杏仁麥冬白

芍當歸蘘仁半夏

青鹽炒

南棗數服痛除

脇痛論治

肝脈布脇膈脈循脇○

肩下曰膊。膊下曰臑。臑對腋。腋下曰肱。肱下曰臑脇。後曰肌。肋下曰季肋。俗名肋梢。季肋

腰下爲

肝者皆足致痛氣鬱者大怒氣逆或謀慮不遂皆令肝火動甚清肝

湯小龍
舊丸。

血瘀者跌撲閃挫惡血停留按之痛甚

飲流注其經嗽則氣急。

控涎丹以二陳湯下。或白芥子湯。

條扛起。

消食風寒者外感之邪留著脇下。

血石痛爲肝邪入肺爲氣痰食亦在右風

不可輕用補肝致令肝脹亦有虛痛者

補肝、怒傷者。香附散。

看道遙

初痛在經久必入絡經主氣絡主

緩者辛溫通絡甘緩補虛當歸桂枝湯有肝陰虛者熱痛盛乾宜涼潤

滋液三才湯加栝子仁白芍有液虛風動者脇氣動躍宜滋液熄風復脈湯去桂薑

有鬱熱脹痛者宜苦辛泄降川棟子黃連山有因怒勞致氣血皆

傷肝絡瘀痺者宜辛溫通絡芫花湯加歸鬚小有痞積攻痛者

宜辛散通瘀桃仁鯁鯉甲乳香沒藥有氣逆嘔涎山脇攻胃者用

酸泄和肝木瓜白芍金橘皮按內經治肝不外甘緩辛散酸瀉三

法凡脇痛藥忌剛燥以肝為剛臟必以柔濟之乃安也

丹溪曰肝苦急是木氣有餘急食辛以散之用川芎青皮醋炒又曰肝火

盛兩脇痛不得伸舒先以琥珀貼患處以薑湯下當歸引脇痛

宜疏肝氣用青皮枳殼香附白芥子之類兩脇走病控涎丹

正傳曰。凡脇痛。皆肝木。有餘。小柴胡湯。加川芎。青皮。芍藥。龍膽草。甚效。青加青黛。麝香。凡性急。多怒之人。常患腹脇痛。白芍。下龍薈丸。甚效。

入門曰。肝熱鬱。則脇必痛。發寒熱。脇痛似有積塊。必是飲食太飽。

勞力所致。當歸龍薈丸。肝氣實。脇痛者。煩燥不安臥。小柴胡湯。加川芎。白芍。當歸。青皮。龍

膽草。肝氣虛。脇痛者。悠悠不止。耳目眩暈。喜恐。四物湯。加柴胡。青皮。

醫鑑曰。脇痛。必用青皮。醋炒。煎服。末服。並效。以青皮乃肝膽二經藥。

多怒。脇有鬱積。宜此解之。若二經氣血不足。當先補血。少用青皮。

脇痛脈候

肝脈搏堅而長。當病墮若搏。因血在脇下。令人喘逆。寸口脈弦。脇痛拘急。雙弦者。兩脇痛。肝脈沈之而急。浮之亦然。脇痛支滿。引小

腹痛小便難得之有所墮墜脈沈滿氣鬱胸脇痛宜作鬱治

附方

清肝湯

白芍錢半 當歸 川芎各一錢 山梔 丹皮各四分 柴胡八分

小龍薈丸

龍膽草 蘆薈 歸 芍 梔 連 大黃 木香 麝香 粥丸 薑湯下

復元活血湯

見二卷血

控涎丹

見二卷痰飲

二陳湯

夏 陳 苔 草

白芥子湯

白芥子 木鱉子 沒藥 桂心 木香 等分 爲末 每一錢煎

消食丸

查 麴 青 陳 麥芽 萊菔子 香附 阿魏

小柴胡湯

見一卷溫

肝虛 怒傷 營和 液滋 熄風 通絡 外貼 肝火 肝虛

補肝散

地 芎 歸 芍 羌 防

香附湯

香附 歸 芍 柴胡 青皮

逍遙散

見一卷火

當歸桂枝湯

歸 桂 芍 草 薑 棗

三才湯

天冬 熟地 人參

復脈湯

見一卷中風

旋覆花湯

旋覆 新絳 葱

琥珀膏

見三卷積聚

當歸龍薈丸

見一卷火

四物湯

地 芍 歸 芎

右脇左脇

推氣散

片薑黃 三錢

枳殼 薑湯調下

桂心 各五錢

炙草二錢

每服

芎藭散

川芎 湯調下

枳實 各五錢

炙草二錢

每服三錢

薑

脇痛

某氏左脇痛臥必偏右欬則氣急痰帶血絲症由五志怫抑損傷營絡倣內經肝苦急急食甘以緩之潞參茯苓甜杏仁白芍杞子棗仁川貝母俱炒桑皮蜜炙金橘皮炙草紅棗煎服效

沈氏氣攻肋脇左右上入乳際痛引胸背子夜特甚思人身氣血於子丑時注肝膽子時注膽丑時注肝今肝陽上升諸氣皆逆勢必營衛

失度瘀濁不降嘔逆便艱有自來矣用微苦微辛以泄降杏仁

當歸鬚青皮醋炒延胡鬱金枳壳炒桔萸廣木香汁冲二服隨定

堂弟右脇久痛牽引背膊呼吸不利欬則痛甚坐必體偃食入稍安右脈浮弦此操勞所傷損動肺絡當春木旺痛難遽止夫諸

氣膈鬱皆屬於肺然痛久則入絡姑用苦辛宜通老韭根當歸
鬚鬱金杏仁川貝母陳皮佛手柑二服痛減按其脇仍覺痞鞭
做鹹以軟堅用旋覆花牡蠣粉白芍金橘皮延胡當歸降香二
服轉用甘緩理虛以參苓歸芍陳貝甘草痛緩其親戚一醫以
爲肝腎陰虛用熟地滋膩竟成單脹矣

郭

去秋肋痛痰血見症於肝不足於腎入春醫用通攝奇經未
效改用桂心蒺藜等藥平肝不知肝爲剛臟藥忌剛燥痛宜益
加矣延至夏初木火相乘體羸食減日晡寒熱欬嗽氣促口乾
舌膩坐則脇背牽引刺痛脈來弦數無神症由情志不遂肝膽
寄居之相火上侮肺金以至痰紅氣急日就羸怯此以水涵木

之法急宜進商也阿膠麥冬白芍貝母各二錢五味子五石斛黑

豆皮各三錢丹皮二錢服寒熱止嗽痛減食加餐矣又令晨服燕

窩湯晚服生脈散症有起色

韓 右脇有塊梗起攻胸氣痺食少背脹引背此肝強胃弱升降

失和泄肝通胃可效厚樸枳殼杏仁萸仁青皮旋覆花降香末

木瓜三服而平

三ノ目 長ノ目

ノ目

腹痛論治 腹中窄狹附

人身背爲陽。腹爲陰。中脘屬太陰。小腹左右屬厥陰。臍腹正中屬少陰。衝任經論寒痛十一條。熱痛一條。寒熱痛二條。血虛痛一條。此泛言猝痛而腹痛該之矣。其症有暴痛久痛。實痛虛痛。有痛在氣分。血分。在腑在臟。在經絡之辨。凡暴痛非熱久痛非寒。虛痛喜按。實痛拒按。痛在氣分者。攻注不定。在血分者。刺痛不移。痛在腑者。脈多弦滑。在臟者。脈多沈微。初痛邪在經。久痛必入絡。經主氣。絡主血也。感寒腹痛者。氣滯陽衰。喜熱手按。脈沈遲。治在溫中。香砂理中湯。感寒嘔痛者。氣虛兼痰。脈弦滑。治在健運。香砂六君子湯。去白朮。氣滯兼食者。腹中有一條扛起。利後痛減。脈沈滑。治在消導。香砂枳木湯。加神麴。

麥芽或寒氣滯痛兼脹滿者治在溫通排氣飲加枳胃虛肝乘吐

酸濁者治在辛泄吳茱萸湯傷寒腹急痛陽脈濇陰脈弦治在甘緩建

中太陰寒痛自利脈沈理中厥陰寒痛肢厥脈細當歸四逆湯少陰寒

痛四肢沈重欬嘔下利脈沈細真武湯外感兼宿食或中暑霍亂吐

瀉藿香正氣散六和湯胸腹絞痛上不得吐下不得瀉名乾霍亂脈沈伏以急

燒鹽湯探吐再火鬱痛時作時止熱手按而不減脈洪疾清中湯

服藿香正氣散火鬱痛時作時止熱手按而不減脈洪疾或二陳

湯加梔芩熱厥痛時作時止金鈴七情氣鬱攻衝作痛三因七氣

連芩鬱金熱厥痛時作時止子散血虛腹痛飢勞必甚芍藥

理氣不應脈芤濇痛如芒刺為血鬱散血虛腹痛飢勞必甚芍藥

甘草湯加氣血虛寒腹痛脈微按之溫之必稍緩大營煎當臍疔

桂枝當歸氣血虛寒腹痛脈微按之溫之必稍緩理陰煎當臍疔

病皆係肝脾絡血瘀結失笑散加歸若腎虛任脈為病六味丸凡

痛久必入血絡。非香燥可劫。治宜宣絡。旋覆花湯加歸死血痛由

血絡阻痺。桃仁承氣湯積聚痛由宿有癥瘕。木香檳榔丸去大黃

跌傷痛由血瘀脇腹。復元活酒積痛由溼熱阻滯。麴蘆小腹痛

痛由經閉血滯。玉燭散去硝黃。思傷脾氣。疴結悸痛。歸脾湯。怒傷

肝火痞結刺痛。柴胡疏肝散。蟲痛時作時止。有塊梗起。口吐清水。

唇有紅點脈乍大乍小。烏梅丸加減。疝氣痛必引睪丸。香橘散。腸

癰痛身皮甲錯小便如淋腹皮急按之濡。左足屈者。小腸癰。牡丹

十味排中惡腹痛霍亂吐利。蘇合大抵腹痛寒淫為多熱淫為少。

以陰寒尤易阻塞陽氣也。腹痛氣滯者多血滯者少。理氣滯不宜

動血。理血滯則必兼行氣也。古謂痛則不通通則不痛。故治痛大

腹痛

法不外溫散辛通而其要則初用通腑久必通絡尤宜審虛實而施治者矣

腹中醫通云肥人乃是溼痰留滯氣不升降當行氣燥溼越鞠丸

為瘦人乃是陰虛火旺熏蒸臟腑當降火開鬱逍遙散肥人

腹中轉轉有聲須作痰治二朮二陳湯氣虛者加參

腹痛脈候

陰弦腹痛細小緊急皆腹痛濡滑為痰飲短滑為宿食乳瀉為死血沈伏為氣滯尺脈緊臍下痛弦急小腹痛痛甚者脈必伏大為病久細小而遲者易治實大堅疾緊數浮長者難治大痛而喘人中黑者死陰弦或緊宜溫沈弦滑實可下

附方

香砂理中湯 理中加 木香 砂仁

香砂六君湯 六君加 木香 砂仁

香砂枳朮丸 見本卷頭痛

保和丸 見二卷痰飲

排氣飲 見三卷積聚

吳茱萸湯 見三卷嘔吐

小建中湯 桂 芍 莖 草 棗 飴

當歸四逆湯 歸 桂 芍 辛 草 通草 薑

真武湯 見二卷喘

溫中 健胃 消導 導滯 通利 辛泄 甘緩 厥陰 少陰 陰

寒虛營和鬱血氣行鬱氣厥熱熱痰鬱火解和亂

藿香正氣散 見一卷中風

六和湯 見一卷暑

清中湯 見本卷心痛

二陳湯 夏 陳 苓 草

金鈴子散 見三卷鬱

七氣湯 見二卷欬嗽

五磨飲 四磨飲見二卷哮喘 此去人參加 枳實 木香

手拈散 見本卷心痛

芍藥甘草湯 芍 草 脈緩傷水加桂枝 生薑 脈洪傷

大營煎 見三卷關格

大聚 脈瀉傷血加當歸

氣

血

絡

脈

補

陰

宜

絡

通

療

積

聚

熱

積

傷

跌

理陰煎

見二卷欬嗽

失笑散

見本卷胃脘痛

六味湯

見一卷中風

旋覆花湯

旋覆 新絳 葱

桃仁承氣湯

見一卷疫

木香檳榔丸

見三卷積聚

阿魏丸

連翹 黃連各五錢

山查

阿魏各二兩

醋者

復元活血湯

見二卷血

翹蘗丸

神麴 麥芽 枳實 白朮

玉燭散

四物湯加 大黃 芒硝 甘草

腹痛

傷脾 結 肝 火 蠱 動 虻 厥 痛 痛 痛 痛 腸 癰

歸脾湯 見二卷勞瘵

柴胡疏肝散 見二卷勞瘵

左金丸 黃連 吳萸

理中安虻散 見三卷嘔吐

烏梅丸 見三卷嘔吐

香橘散 茴香 炒 錢 橘核 查肉 溫酒調下

立效散 查肉 一兩 川棟子 茴香鹽水炒 枳實 芩朮 香附 山梔 薑汁炒 青皮醋炒各五錢 吳萸三

錢 爲末 每服五錢

大黃湯 丹皮 枯蘘各三錢 桃仁 大黃 芒硝各二錢

牡丹散 見本卷胃脘痛

腸癌中惡六鬱利溼降火除痰

排膿散 見一卷肺癰

蘇合香丸 見一卷中風

越鞠丸 見三卷鬱

平胃散 木 樸 陳 草

逍遙散 見一卷火

二朮二陳湯 見二卷痰飲

腹痛

夏氏當臍旁痛觸寒屢發痛來飲食都廢神色清減脈虛芤據述
服和肝調氣不應數年前曾以鴉片烟膠爲丸服下痛止夫鴉
片能行下身經絡此症因藥血絡阻滯爲患况痛久人絡宜辛
溫以通之若但如回七湯因磨飲僅開氣分背賢謂經主氣絡
主血不分經絡安能應手用當歸鬚酒延胡酒小荷酒新絳桃仁
研旋覆花絹包服效

薛 寒熱欬嗽數日後小腹墜痛疑爲腸癰診脈浮弦全不沈數
乃絡虛氣聚非腸癰也用杏仁栝蒴茴香橘核當歸延胡俱酒
木瓜二服全瘳

沈氏冬寒小腹痠聚左脇撐痛上攻胸背大小便不通脹悶欲絕
湯飲不下兼發寒熱脈短澀宜先導其瘀滯古云痛則不通也
枳壳桃仁各二錢厚樸直製青皮各七分延胡酒炒歸尾酒潤蘇桂
郁李仁各二錢沈香磨汁二服痛定二便通調惟左脇偶一隱痛
原方去桃仁歸尾蘇梗延胡加鬱金香附沈香改木香仍磨汁
冲服又將煎劑挂為細末服愈

肩背手臂痛論治

經曰背者胸中之腑。背曲肩隨。腑將壞矣。又曰肺病者喘欬逆氣。肩背痛汗出。又曰肺盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背寒。少氣不足以息溺色變。又曰邪在腎則肩背痛。是腎氣上逆也。蓋肩背為太陽經所循。又為肺臟分域。凡太陽經及肺俞為病。固足致痛。而腎氣逆攻亦足致痛焉。故肩背痛不可回顧。此手太陽經氣鬱不行。宜風藥散之。防風通氣散。肩背痛脊強腰似折項似拔。此足太陽經氣鬱不行。羌活勝濕湯。如肺受風熱而肩背痛。羌活肺氣虛而肩背寒。補中益氣湯。加麥味腎氣逆衝挾脊而上攻背痛者。係督脈主病。治在少陰。宜川椒桂枝茯苓附子牛膝遠志沈香小茴香。亦有肝濁逆衝。

從腹而上攻背痛者。係衝任主病。治在厥陰。宜乾薑、川椒、桂枝、烏

棟傷溼而肩背重痛者。當歸拈痛湯。寒飲伏結肩背冷痛者。白朮附子湯。素

有痰飲流注肩背手臂作痛者。導痰湯。因於氣滯者。烏藥順氣散。因於血

虛者。四物湯。加秦艽、薑黃。因營虛絡脈失養風動筋急者。舒筋陽明脈衰肩

胛筋緩不舉而痛宜調補絡脈。生膏於朮、當歸、防風、根、督脈虛背

痛脊高突。鹿角霜、杞子、歸身、勞力或坐久而致脊背痛者。補中益

人珍湯。杜仲、茯苓、沙苑子。更須加防風、引經。肥人喜撫而痛減者。

屬痰宜除溼通痰兼補脾氣。六君湯。瘦人多山營弱衛衰宜調氣

養血。聖愈湯。加桂枝、白芍。手臂為手六經交會或為風寒溼所搏或因飲

液流入或因提挈重物皆能致痛。因風溼者。除溼蠲痹湯。加因風

熱者。秦朮地。因寒溼者。五積散。溼痺經絡者。蠲痺。肢節痛。臂不能
 舉者。舒筋湯。加油。骨痛筋攣。血脈凝滯者。透經解。痰飲流入四肢。
 肩背手臂痠痛。輭痺者。導痰湯。加薑。炒。中腕停痰。伏飲。脾不能運。
 臂戰不舉。脈來沈細者。指迷茯苓丸。挈重傷筋。臂痛宜和氣調血。十全
 湯。血不榮筋者。湯。加玉。作。手屈而不能伸者。病在筋。意苒。伸而不
 能屈者。病在骨。白朮附。手腫痛連臂。加桑枝。凡用。桂。能橫行手臂。
 片子。能引至手臂。節。油。松。能透入骨節。丹溪治臂痛。以。二陳湯。加酒。
 薑。黃。是風痰溼熱兼治也。

附方

散。防風通氣散。羌。防。荆。術。木。歸。芍。芎。翹。
 風。防風通氣散。薄荷各五錢。桔。梗。黃。芩。石膏各一兩。

除溼風熱提升傷溼寒飲痰候氣滯血虛營虛

甘草 滑石各二兩 每服
八錢 加 薤 葱 水煎

羌活勝溼湯 見一卷溼

羌活散 羌 防 辛 芎 枳
前胡 石膏 加 薤 煎

薊 芩 苓 草 蔓 荆

補中益氣湯 見一卷中風

當歸拈痛湯 見一卷溼

朮附湯 見一卷瘧

導痰湯 見一卷中風

烏藥順氣散 見一卷中風

四物湯 地 芍 歸 芎

舒筋湯 薤黃四兩 草 羌各一兩 歸 朮 赤芍 海
桐皮各二兩 每服五錢 薤 水煎

勞力通用補脾氣血風溼風熱寒溼溼痺痺痛

八珍湯

見一卷中風

薤黃散

薤黃四兩 雨 水煎

炙草

羌活

白朮各一兩

每服一

六君湯

見一卷中風

聖愈湯

見二卷勞瘵

除溼蠲痛湯

一名除溼蠲痺湯見五卷痺

秦艽地黃湯

見五卷痺

加減五積散

見一卷溼

蠲痺湯

見五卷痺

透經解攣湯

炮甲片三錢 蘇木 蟬蛻

羌防 天麻各七分

荆草 紅花 連

翹

川芎各五分

水煎

停飲挈重血虛不伸痰注

指迷茯苓丸

見二卷痰飲

十全大補湯

見一卷中風

秦艽四物湯

見五卷痺

薏仁湯

薏苡 歸 芍

麻黃

官桂

蒼朮

甘草

薑

二陳湯

見一卷中風

腰脊腿足痛論治

腰痠

腰僵

腰軟

尻

膝

跟附

經云腰者腎之腑。又云太陽所至爲腰痛。惟腎與膀胱相表裏。故腰在經則屬太陽。在臟則屬腎。經言太陽腰痛者外感六氣也。而經言腎經腰痛者內傷房勞也。而又爲衝任督帶之要會。其所由致痛者。以腎氣本虛。而風寒溼熱之邪。皆可乘虛而入。卽諸奇經亦多統繫焉。凡腰脊痠痿。縣縣作痛。并腿足痠軟者。腎虛也。遇陰雨則隱痛。或久坐覺重者。溼也得寒則痛。喜近溫暖者。寒也得熱則痛。喜近清涼者。熱也。閃挫痛。或跌扑損傷者。血瘀也。肝脾傷。山憂思鬱怒者。氣滯也。負重致痛者。勞力也。凡此皆屬標。而腎虛爲本。詳其治法。腎虛痛者。多由房慾。但察其既無表邪。又非溼熱。或年力衰頹。或情志怫鬱。或行立不

支而坐卧少可。或疲倦無力而動勞益甚。或面色慘晦。脈候虛微。

皆腎經不足也。但腎陽虛者。脈微無力。小便清利。神疲氣短。宜益

火之源。腎氣丸。腎陰虛者。脈洪而數。虛火時炎。小便黃赤。宜壯水

之主。地黃湯。腎陰陽俱虛者。脈虛而大。宜水火平調。無比山

氣乘虛侵犯太陽。如傷風腰痛症。必寒熱脈必浮痛連背脊牽引

兩足。小續命湯加城。傷寒腰冷如冰。脈必緊得熱則減。薑附湯加肉桂。杜

傷溼由坐卧溼地。或傷雨露身重。脈緩天陰更甚。腰溶溶如坐水

中。宜茯苓皮。木防己。晚蠶沙。滑石。溼兼風。一身盡痛。羌活勝溼湯。獨活寄生湯。

溼兼寒。腹痛自利。薑附。溼兼熱鬱久化火。當歸拈。風寒溼痺痛。烏

頭三箇。生搗爲末。少加鹽。熱痛脈必洪數。口渴便秘。甘豆湯。加如

水。調難。帛上貼痛處立止。熱痛脈必洪數。口渴便秘。續斷天麻。如

陰虛火盛。當滋陰降火。滋陰八味丸。閃挫跌扑諸痛。肝脈搏堅而長。兩

尺實不可俯仰。復元通氣散。酒調下。若血瘀痛轉動如刺。大便黑或秘結。四

湯。加紅花、桃仁、穿山甲、延胡索、大黃、外用酒糟、葱白、生薑、氣滯腰痛。脈沈弦或結伏。

烏藥順氣散。不肝氣失暢。臥覺腰痛。頻欲轉側。曉起則止。柴胡疏

應。八味順氣散。痰注痛。脈滑或沈痛在一塊。導痰湯。加香、傷力、腰痛。太補湯。下腰。

朋如帶束引痛。此帶脈為病。宜辛散其結。甘緩其急。用延胡、歸、桑寄生、杞子。

小荷、沙苑子。痛久絡虛。宜調補奇脈。用核桃、當歸、杜仲、羊腰、老、人

或調肝散。虛人腎虧腰痛。不能轉側。宜二至丸。腰痠屬房勞腎虛。宜峻補。青

丸。若走精。六味丸。去澤泄。加魚、婦女腰痠。六味丸。加腰、僂、廢、乃熱

邪深入血脈久閉。桃仁承氣湯。多用肉桂。少用熟附子行經。痛者可治。不痛久廢者不

可治腰輭。溼襲經絡者。腎著湯。風襲腰背者。牛膝酒。跣喪太過者。八味丸。

丹。脊者督脈及太陽經所過。項脊常熱而痛者。陰虛也。六味丸。

常寒而痛者。陽虛也。八味丸。太陽經脊痛項強。腰似折。項似拔。活

勝溼。脈浮緊為傷寒。麻黃湯。沈緩為風溼。柴胡湯。尻乃足少陰及

督脈所經。兼屬厥陰。尻痛屬腎虛者。七味丸。不肥人屬溼痰。二陳

散。二妙。腿足為足六經所至。痛有陰虛。陽虛。血虛。血寒。腎虛。風襲

寒溼。風溼。溼熱之症。陰虛者。體羸。足心及股脛熱痛。左尺細數。或

兩尺數盛。虎潛丸。去陳。陽虛者。足浮腫無力。大便瀉。左尺虛大。或

兩尺浮遲。脾與命火俱衰。先用補中益氣湯。加血虛者。足不任地。

行則振掉。脈細弱。六味湯。加續。血寒者。筋急。脈沈喜近湯火。舒筋

斷。鹿茸。杜仲。

三聖。

散。腎虛風襲則下體痿弱。骨節疼痛。尺中浮大而數。安胃湯。寒溼者。

兩腿隱痛。或麻頑作腫。身重肢節痛。脈沈者。白朮附子湯。脈浮滑者。除

活羌風溼者。腫痛走注。獨活寄生湯。溼熱者。或上或下。或紅或腫。溺赤。

脈濡數。當歸拈痛湯。更有腿轉筋上衝入腹。宜瓜蒌散。詳腳氣門。膝者筋

之腑。屈伸不利。行則僂俯。筋將憊矣。其膝痛在筋則屈不能伸而

腫多挾風熱。二妙散。加兼陰虛則熱而不腫。虎潛丸。若膝脛痺弱重

痛多挾風溼。獨活寄生湯。夏月溼熱腫痛。當歸拈痛湯。屈伸不利。活絡丹。虛寒

兼挾風溼作痛。虎骨四觔丸。虛熱筋痿顛掉作痛。鹿茸四觔丸。足跟痛屬

腎陰虛者。脛熱跟痛。六味丸。加腎陽虛者。不能久立。八味丸。挾溼者

必重著而腫。換骨丹。足心為少陰腎經湧泉穴。所注足心及踝骨熱

痛者為腎虛溼著。腎著湯下。或用二至丸。六味丸。立安丸。

附方

陽虛 腎氣丸 見二卷虛損

陰虛 鹿茸丸 鹿茸焙去毛 兔絲子各一兩 硫黃五錢 為末 以羊腎兩對酒煮爛去膜研如泥和丸 鹽酒湯下

陰虛 六味地黃湯 見一卷中風

陰虛 滋陰大補丸 見五卷痿

陽虛 無比山藥丸 熟地 黃肉 牛膝 茯神 巴戟 澤瀉 赤石脂各一兩 杜仲 兔絲子 山藥各三

兩 肉苁蓉四兩 蜜丸 酒下三錢

風痛 小續命湯 見一卷中風

寒溼 萸附湯 炮附子 苓 朮 草 樸 蒼朮 杜仲 牛膝 乾薑 淡薑 棗

外用

壓腰膏

川附尖 川烏尖 南星各二錢半 朱砂 雄黃

為末蜜丸龍眼大以薑汁化開擦腰間 醫通有蜀椒無味

砂云以膏醮手掌每日飽後用

東定少頃 熱如火 九烘熱摩腰痛處卽以帛

滲溼湯

見一卷中風

腎著湯

見一卷溼

羌活勝溼湯

見一卷溼

獨活寄生湯

見一卷溼

當歸拈痛湯

見一卷溼

甘豆湯

黑豆二合 甘草二錢 續斷二錢 天麻一錢

滋陰八味丸

六味丸加 知 藥各酒炒

火降痛熱熱溼風溼風溼痛溼痛溼

閃挫血瘀 復元通氣散 見本卷心痛

四物湯 地 芍 歸 芎

烏藥順氣散 見一卷中風

八味順氣散 見一卷中風

柴胡疏肝散 見二卷勞瘵

導痰湯 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風

青娥丸 骨脂 杜仲 等分爲末以核桃肉研膏加煉蜜爲丸 每酒下四錢

調肝散 半夏 一兩 官桂 木瓜 歸 芎 牛膝 各五錢 細辛 石菖蒲 棗仁 炙草 各三錢 每服四錢

加薑五片 棗二枚 水煎

腎虛 腎虛 血閉 風襲 補火 補腎 傷寒 風溼 腎虛 溼痰

二至丸

桂附

杜仲

骨脂

鹿茸

鹿角膠

麋茸

立安丸

牛膝

杜仲

故紙各四兩

黃蘗

茴香各二兩

桃仁承氣湯

見一卷疫

牛膝酒

羌活

芎草

地骨

五加

薏仁

牛膝各二兩

八味丸

見一卷中風

補髓丹

卽上青娥丸加

鹿茸

麻黃湯

麻

桂

杏

草

柴胡湯

羌活

錢半

蒼朮

柴

桂

歸

芎草各一錢

七味丸

見一卷中風

二陳湯

見一卷中風

痿

一妙丸

見一卷痿

熱

虎潛丸

見一卷中風

痛

補中益氣湯

見一卷中風

血中

舒筋三聖散

當歸 肉桂 延胡 爲末每服五錢

寒

安腎湯

骨碎補 草薢俱炒 牛膝 桃仁 海桐皮 當歸 桂心 檳榔各五分 赤芍 附子 川芎

寒

水附湯

見一卷痿

風

除淫羌活湯

見一卷中風

氣

瓜蒌散

見一卷腳氣

熱

活絡丹

見一卷痺

風溼虛熱挾溼

虎骨四筋丸

見五卷痿

鹿茸四筋丸


虎骨四筋丸去附子虎骨
絲子熟地杜仲

加鹿茸二具

兔

換骨丹

見五卷鶴膝風



腰足痛

孫 中年胃陽痿腰痛溶溶如坐水中形色萎不勝剛燥用溫養

少陰兼聖奇脈杞子補骨脂核桃肉當歸牛膝酒蒸續斷杜仲炒

沙苑子炒酒浸服效

耿 腹痛舊恙行走勞倦輒發今由少腹痛引腰臥則少緩服來

虛懷少神乃衝督經病用小茴香沙苑子補骨脂降香末杜仲

得汁炒核桃肉鹿角霜二服痛除

巢氏中年經斷兩尺扎弱下元先虧腰膝痠痛宜溫補下焦必月

事來乃望體安杞子熟地俱炒牛膝酒蒸當歸沙苑子兔絲餅茯苓

核桃肉十數服而如常

魏氏秋間崩漏數次脛膝骨熱曾用攝補而安今經止數月腰痛
由季脇控引少腹輒疑瘀動將崩診脈左寸動胎也非瘀也痛
引季脇必帶脈虛爲病按衝任二脈循腹脇夾臍旁皆絡於帶
而帶脈之病實太陰所主故素問言邪客太陰之絡令人腰痛
引小腹控眇不可以養息而王叔和謂帶脈爲病左右繞臍腰
脊痛也宜治帶脈以固胎元如所服參耆地朮呆補不能入奇
經安望有效沙苑子杞子小茴香歸鬚續斷杜仲桑寄生補骨
脂精稻根鬚數服痛止又用膏方而胎固

吉氏有年久嗽痰紅頭眩院悶欬則腰痛苦折少腹筋掣痛注右
腿艱於起坐臥必偏左脈左沈弦右沈弱症屬肝腎虧損但先

從氣分調補勿用血藥滯膩沙苑子橘核常歸炒俱酒杜仲鹽水炒茯苓砂仁壳川貝母蔓霜甜杏仁炒白芍炒核桃肉三服痛止嗽稀更訂膏方用血燕根猪脊髓桑寄生杞子核桃肉製首烏玉竹潞參當歸茯神洲蓮子鹿角膠收膏每用膏六錢開水服全愈

族兄小腹右偏痛直注大股正面側面而下至膝蓋止因行走勞頓寒熱痛發必是小腹先受寒襲於腿經故痛而發寒熱也宜溫通勿使成痺但在高年不宜過劑橋核酒炒木香木瓜歸鬚牛膝小茴香桑寄生生薑葱白再服微汗而痛如失

--	--	--

身痛論治

一身盡痛。凡傷寒、傷暑、傷濕、霍亂、陰毒及一切寒濕風溼熱內傷、寒熱氣血經脈不和諸症，皆有之。如傷寒發熱身痛拘急，脈浮緊，麻黃湯或九汗後身仍痛，脈沈遲，桂枝加中，暑傷氣自汗身痛，味羌活湯。神倦脈虛，清暑益中，溼身痛身重不能轉側，脈細緩在裏，五苓散。霍亂吐瀉身痛口渴，渴少脈伏，五苓散。陰毒身痛如被杖面青咽痛，脈沈細而疾，升麻鳖甲湯。寒濕相搏但頭汗出背強身痛，脈沈澹，甘草湯。風溼相搏一身盡痛，脈虛浮而濡，除濕湯。溼熱相搏遍身煩痛，脈滑而疾，當歸拈內傷勞倦兼風溼身痛，補中益氣湯。寒熱身痛，胸脇不舒肝血虛而火鬱，加味逍遙散。渾身走注作痛或經脈牽引但

行氣活血。三癰。凡肢節痺痛。屬火。身體沉重。屬溼。拘急。屬寒。腫。屬
溼。遊走不定。屬風。痛在一處。如冰冷。屬痰。下體痛而溺少。宜分利。
五苓散。下體腫痛。脈浮。自汗惡風。宜泄溼。兼實表。防風黃
耆湯。尤宜察其
兼症而審治之。

身痛脈候

傷寒六脈俱緊。為太陽表症。身如被杖。脈沈緊。為陰毒。發汗後。脈
弦遲。身痛。為氣血不和。一身關節盡痛。而脈沈弦。為中溼。肢體重
痛。微腫。汗出惡風。關節不利。不可轉側。脈緩。為風溼。遍身痛。脈弦
小或滑大。為氣血虛損。

附方

傷寒傷寒傷寒傷寒傷寒傷寒傷寒傷寒傷寒傷寒

麻黃湯 麻 桂 杏 草

羌活湯 見五卷破傷風

桂枝加人參湯 見一卷傷風 去當歸

清暑益氣湯 見一卷暑

除濕湯 見一卷中風

五苓散 見一卷溫

升麻鼈甲湯 升麻 鼈甲 當歸 甘草 川椒 雄黃

甘草附子湯 草 附 芍藥

除濕蠲痺湯 見五卷痺

當歸拈痛湯 見一卷澤

內傷肝火走泄注泄

補中益氣湯

見一卷中風

加味逍遙散

見一卷火

三癰湯

見五卷癰

防己黃耆湯

見一卷泄